

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ANTIMEDIN

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI / FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Apicenna", 143985, reg. Moscova, or. Balașiha, ș. Poltevkoe 4, Tel.: 89626252752
e karbysheva@apicenna.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Antimedon

Soluție injectabilă.

1 ml conține:

Substanță activă:

Clorhidrat de atipamezol - 5 mg.

Excipienți:

Clorură de sodiu, alcool benzilic și apă pentru injecții.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Antimedon se indică la câini și pisici pentru reversia efectelor sedative și analgezice a medicamentelor din grupa α_2 -agoniștilor (medetomidina, dexmedetomidina), precum și a efectelor secundare asupra sistemelor cardiovascular și respirator a organismului.

4. CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate individuală la substanța activă sau la oricare dintre excipienți ale medicamentului.

A nu se administra în caz de insuficiență cardiacă, disfuncții hepatice sau renale.

Antimedon nu se folosește pentru înlăturarea efectelor sedative a medicamentelor din alte grupe farmacologice.

A nu se administra animalelor productive.



5. REACȚII ADVERSE

În cazuri rare, după administrarea medicamentului (în perioada de reversibilitate), la animalul se poate manifesta delir, o senzație de anxietate și agresivitate.

Este necesară supravegherea animalului pentru a identifica hipotermia, bradicardia, deprimarea respirației și schimbările gradului anesteziei.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Antimedîn se administrează peste 15-60 min. după utilizarea a medicamentelor din grupa α_2 -agoniștilor.

De regulă acțiunea sedativă a medetomidinei și dexmedetomidinei se neutralizează peste 5-10 minute după administrarea Antimedinei.

În cazul unei stări depresive continue, este posibilă administrare repetată a medicamentului Antimedîn peste 10 - 15 minute.

Antimedîn se administrează intramuscular, o singură dată, în doze (ml/animal):

- **câini**-în doză egală cu doza administrată inițial de medetomidină/dexmedetomidină;
- **pisici**-în doză egală cu $\frac{1}{2}$ din doza administrată inițial de medetomidină/dexmedetomidină.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalaj închis a producătorului, la loc uscat, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la $T^{\circ}\text{C} +5^{\circ}\text{C} - +25^{\circ}\text{C}$, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar nefolosit se elimină conform legislației în vigoare.

Ambalajele se elimină cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Se recomandă monitorizarea stării animalelor după administrare (se exclude hipotermia, bradicardia, dispneea și nivelul anesteziei).

În caz de primă administrare a medicamentului animalul poate manifesta delir, anxietate și agresivitate.



De regulă Antimedîn se administrează o singură dată. În caz dacă este necesară utilizarea repetată a medicamentului Antimedîn, se va administra după 10 - 15 minute în aceeași doză.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Antimedîn, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

Persoanelor cu hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți, se recomandă evitarea contactului direct cu Antimedîn.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare a medicamentului).

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Siguranța acestui medicament de uz veterinar nu a fost stabilită pentru utilizarea în timpul gestației și lactației. Posibilitatea utilizării medicamentului de uz veterinar la aceste grupuri de animale este determinată de medicul veterinar pe baza unei evaluări a beneficiului așteptat față de riscul posibil al utilizării acestuia.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu este permisă amestecarea medicamentului Antimedîn în aceeași seringă cu alte medicamente. Utilizarea antagoniștilor receptorilor α_2 - adrenergici împreună cu medicamente anticolinergice sau medicamente cu efect cronotrop pozitiv, poate provoca tahicardie excesivă.

Supradozare

În cazul supradozării animalul poate manifesta hiperactivitate de scurtă durată și tahicardie.

În cazul hiperactivității la pisici se recomandă minimalizarea stimulilor externi.

Administrarea medetomidinei în doză egală cu $\frac{1}{2}$ din doza administrată de Antimedînă înlătură simptomele supradozării atipamezolului.

Incompatibilități:

A nu se amesteca într-o seringă cu alte medicamente.

12. PERIODA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 30 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.



13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă cu dop din cauciuc și capac din aluminiu a câte 5, 10, 20, 50 și 100 ml

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

10.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVASRL

"Zoofarmagro" m. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR