



## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### AINIL

soluție injectabilă

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

### 1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

#### Deținătorul:

Invesa  
Industrial Veterinaria, S.A.  
a LIVISTO company  
Esmeralda, 19  
08950 Esplugues de Llobregat  
(Barcelona) Spania

#### Producătorul și responsabilul pentru eliberarea lotului este:

Industrial Veterinaria, S.A.  
Esmeralda, 19 ani  
08950 Esplugues de Llobregat  
(Barcelona), Spania

### 2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

#### AINIL

Soluție injectabilă

1 ml conține:

#### Substanța activă:

Ketoprofen, - 100 mg.





#### **Excipienți:**

Alcool benzilic - 10 mg

Arginina

Acid citric monohidrat

Apa pentru preparate injectabile

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

**Bovine:** Tratament antiinflamator, analgezic și antipiretic în cazuri de procese inflamatorii asociate cu boli respiratorii, edem mamar, mastita acută și procese inflamatorii musculo-scheletice.

**Cabaline:** Tratamentul stărilor inflamatorii și dureroase ale sistemelor osteoarticular și musculo-scheletic, în special: claudicație (șchiopătură) de origine traumatică, artrită, artroză, traumatisme articulare (entorse, sinovită), fracturi, tendinite, afecțiuni ale piciorului (boală navigabilă, accidente de potcoavă, pododermatită circumscrisă, inflamație), inflamații post-chirurgicale. Tratamentul simptomatic al colicilor.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

Ca și în cazul altor medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, utilizarea este contraindicată la animalele cu insuficiență renală severă.

A nu se utiliza la animale care au prezentat anterior hipersensibilitate la ketoprofen.

### **5. REACȚII ADVERSE**

Ketoprofenul este un medicament sigur și nu au fost înregistrate efecte secundare după administrarea medicamentului în doze terapeutice.

După administrare intramusculară poate apărea un edem local cu durere la atingere și tumefiere pe o rază de 10 cm, care dispare la o săptămână după finisarea tratamentului.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul de uz veterinar nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

### **6. SPECII ȚINTĂ**

Bovine și cabaline.

### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

#### **Bovine:**

Utilizare intravenoasă sau intramusculară.

Se administrează 3 ml/100 kg greutate corporală (echivalent cu 3 mg ketoprofen/kg g.c.) zilnic timp de 1 până la 3 zile consecutive.



**Cabaline:**

Utilizare intravenoasă.

Se administrează 1 ml/45 kg greutate corporală (echivalent cu 2,2 mg ketoprofen/kg g.c.) zilnic timp de 3 până la 5 zile consecutive în tratamentul afecțiunilor sistemului musculo-scheletic și osteoarticular.

Se administrează 1 ml/45 kg greutate corporală (echivalent cu 2,2 mg ketoprofen/kg g.c.) într-o singură doză în tratamentul simptomatic al colicilor. În general, o singură doză este suficientă; orice injecție suplimentară trebuie precedată de o reevaluare clinică a animalului.

**8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Bovine: Carne și organe: 4 zile; Lapte: 0 mulsori

Cabaline: Nu se utilizează la caii destinați consumului uman

**9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra flaconul în ambalajul secundar.

A se păstra în încăpere uscată, ferit de lumină la temperatura camerei.

A nu se congela.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Medicamentul de uz veterinar fără etichetă, cu termenul de valabilitate expirat, deteriorate sau deschise, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei reziduale sau a reziduurilor menajere.

Întrebați medicul veterinar cum să eliminați medicamentele care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protejarea mediului.

**11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

**Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Nu amestecați cu un alt medicament în aceeași seringă.

**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

Trebuie luate precauții speciale, în caz de injectare accidentală la persoanele cu antecedente de astm bronșic, angioedem, urticarie sau rinite precipitate de AINS.

Persoanele cu antecedente de ulcerăție gastroduodenală, sângerare, insuficiență renală, insuficiență cardiacă, hipertensiune arterială sau insuficiență hepatică trebuie să solicite imediat sfatul medicului și să prezinte eticheta, cutia sau prospectul medicamentului.

Evitați stropirea pe ochi, mucoase, răni sau piele iritată. Se recomandă spălarea zonei cu apă din abundență.

**Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:**

Întrucât efectele ketoprofenului asupra fertilității, gestației sau a sănătății fetale la cabaline nu au fost determinate, medicamentul nu trebuie administrat la iepele gestante, nu se recomandă utilizarea medicamentului mănșilor cu vârsta mai mică de 15 zile

**Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

Nu administrați concomitent alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), nici diuretice sau anticoagulante

**Supradozare:**

Poate fi identificată prin anorexie, vărsături și diaree.

**Incompatibilități:**

Nu amestecați cu substanțe acide.

**12. PERIOADA DE VALABILITATE**

Perioada de valabilitate: 3 ani de la data de fabricare.

Perioada de valabilitate după prima deschiderea a flaconului: 28 zile.

Se interzice utilizarea medicamentului după data de expirare.

**13. STATUT LEGAL**

Se eliberează numai pe bază de rețeta veterinară.

**14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacoane de 20 ml, 50 ml și 100 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

**15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

10.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

