Anexa nr. 1

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

TYLOPLUS INJ, 300 mg/ml, soluţie injectabilă pentru bovine şi ovine

2. COMPOZIŢIE CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un ml conţine:
Substanţă activă:
Tilmicozin .....300 mg
Excipienţi:
Pentru lista completă a excipienţilor, vezi secţiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.
Soluţie limpede, vâscoasă, de culoare galbenă până la culoarea chihlimbarului.

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1. Speciile ţintă

Bovine şi ovine

4.2.Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Bovine
Tratamentul bolii respiratorii bovine asociate cu *Mannheimia haemolytica* şi *Pasteurella multocida.*
Tratamentul necrobacilozei interdigitale.
Ovine
Tratamentul infecţiilor tractului respirator cauzate de *Mannheimia haemolytica* şi *Pasteurella multocida.*
Tratamentul pododermatitei la oi cauzate de *Dichelobacter nodosus* şi *Fusobacterium necrophorum.*
Tratamentul mamitei acute ovine cauzate de *Staphylococcus aureus* şi *Mycoplasma agalactiae.*

4.3.Contraindicaţii

A nu se administra intravenos.
A nu se administra intramuscular.
A nu se administra mieilor cu greutatea mai mică de 15 kg.
A nu se administra primatelor.
A nu se administra porcinelor.
A nu se administra cailor şi măgarilor.
A nu se administra caprelor.
Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimenteior
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4.4. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă
Ovine
Studiile clinice nu au demonstrat o vindecare bacteriologică la ovinele cu mamită acută cauzată de *Staphylococcus aureus* și *Mycoplasma agalactiae.*
A nu se administra mieilor cu greutate mai mica de 15 kg, întrucât există un risc de toxicitate asociată supradozării.
Cântărirea cu precizie a mieilor este importantă pentru evitarea supradozării. Utilizarea unei seringi de 2 ml sau mai mică va facilita dozarea precisă.

4.5. Precauții speciale pentru utilizare
4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale trebuie să fie luate în considerare la utilizarea medicamentului de uz veterinar.

Pentru a evita auto-injectarea, nu utilizați echipamente de injectare automată.

Atunci când este posibil, utilizarea medicamentului de uz veterinar trebuie să se bazeze pe un test de susceptibilitate.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Atenţionări privind siguranţa pentru operator

INJECTAREA TILMICOZINULUI LA OAMENI POATE FI FATALĂ – ACŢIONAŢI CU EXTREMĂ PRUDENŢĂ PENTRU A EVITA AUTO-INJECTAREA ACCIDENTALĂ ŞI URMAŢI ÎNTOCMAI INSTRUCŢIUNILE DE ADMINISTRARE ŞI RECOMANDĂRILE DE MAI JOS:

- Acest medicament de uz veterinar trebuie administrat numai de către un medic veterinar.
- Nu transportaţi niciodată o seringă încărcată cu Tyloplus inj. 300 mg/ml având acul ataşat. Acul trebuie să fie conectat la seringă numai la umplerea seringii sau la administrarea injecţiei. În orice alte momente, ţineţi seringa separată de ac.
- Nu utilizaţi echipamente de injectare automată.
- Asiguraţi-vă că animalele sunt imobilizate în mod corespunzător, inclusiv cele aflate în apropiere.
- Nu acţionaţi singur atunci când utilizaţi Tyloplus inj. 300 mg/ml
- În caz de auto-injectare, SOLICITAŢI IMEDIAT ASISTENŢĂ MEDICALĂ şi luaţi flaconul sau prospectul cu dumneavoastră. Aplicaţi o compresă rece (nu gheaţă direct) pe locul de injectare.

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. • "ZOOFARMAGRO" S.R.L. • "ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Atenţionări suplimentare privind siguranţa pentru operator:

- Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Clătiţi imediat cu apă orice stropire a pielii sau ochilor.
- Poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea. Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.

NOTĂ PENTRU MEDIC

INJECTAREA TILMICOZIN LA OAMENI A FOST ASOCIATĂ CU DECESE.
Sistemul cardiovascular este ţinta toxicităţii, iar această toxicitate poate fi cauzată de blocarea canalelor de calciu. Administrarea intravenoasă de clorură de calciu trebuie să fie luată în considerare numai dacă există o confirmare pozitivă a expunerii la tilmicozin.

În cadrul studiilor pe câini, tilmicozin a indus un efect inotrop negativ care a dus la tahicardie, precum şi o reducere a tensiunii arteriale sistemice şi a pulsului arterial.

NU ADMINISTRAŢI ADRENALINĂ SAU ANTAGONIŞTI BETA-ADRENERGICI, CUM AR FI PROPRANOLOL.

La porcine, letalitatea indusă de tilmicozinul este potenţată de adrenalină.

La câini, tratamentul cu clorură de calciu administrată intravenos a demonstrat un efect pozitiv asupra stării inotrope a ventriculului stâng şi unele îmbunătăţiri ale tensiunii arteriale vasculare şi ale tahicardiei.

Datele preclinice şi un raport clinic izolat sugerează că perfuzia cu clorură de calciu poate ajuta la reversibilitatea modificărilor induse de tilmicozin asupra tensiunii arteriale şi ritmului cardiac ale oamenilor.

Administrarea de dobutamină trebuie, de asemenea, să fie luată în considerare datorită efectelor sale inotrope pozitive, deşi aceasta nu influenţează tahicardia.

Întrucât tilmicozin persistă în ţesuturi timp de câteva zile, sistemul cardiovascular trebuie să fie monitorizat îndeaproape şi trebuie să se furnizeze tratament de susţinere.

4.6. Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Ocazional, o inflamare difuză uşoară poate apărea la locul de injectare, însă aceasta dispare în decurs de cinci până la opt zile. În cazuri rare, au fost observate decubit, lipsă de coordonare şi convulsii.

Decesul bovinelor a fost observat după o doză intravenoasă unică de 5 mg/kg greutate corporală şi după injectarea subcutanată a dozelor de 150 mg/kg greutate corporală la intervale de 72 de ore. Ovinele au decedat după o injecţie intravenoasă unică cu 7,5 mg/kg greutate corporală.

4.7. Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Siguranţa medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei.
Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. · "ZOOFARMAGRO" S.R.L. · "ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603421
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMOMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4.8. Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
La unele specii, se pot observa interacţiuni între macrolide şi ionofore.

4.9. Doză şi calea de administrare
Numai pentru injecţie subcutanată.
Utilizaţi 10 mg tilmicozin per kg greutate corporală (ceea ce corespunde cu 1 ml *Tyloplus inj 300mg/ml* per 30 kg greutate corporală).

Bovine:
Metodă de administrare:
Extrageţi doza necesară din flacon şi scoateţi seringa din ac, lăsând acul în flacon. Atunci când trebuie tratat un grup de animale, lăsaţi acul în flacon pentru a scoate dozele ulterioare. Imobilizaţi animalul şi introduceţi acul separat subcutanat la locul de injectare, de preferat în pliul pielii de deasupra cutiei toracice, în spatele umărului. Ataşaţi seringa la ac şi injectaţi la baza pliului pielii. Nu injectaţi mai mult de 20 ml per loc de injectare.

Ovine:
Metoda de administrare:
Cântărirea cu precizie a mieilor este importantă pentru evitarea supradozării. Utilizarea unei seringi de 2 ml sau mai mică îmbunătăţeşte dozarea precisă.
Extrageţi doza necesară din flacon şi scoateţi seringa din ac, lăsând acul în flacon.
Imobilizaţi oaia în timp ce vă aplecaţi peste animal şi introduceţi un ac separat subcutanat la locul de injectare, care ar trebui sa fie într-un pliu al pielii de deasupra cutiei toracice, în spatele umărului. Ataşaţi seringa la ac şi injectaţi la baza pliului pielii. Nu injectaţi mai mult de 2 ml per loc de injectare.
Dacă nu se observă îmbunătăţiri în decurs de 48 de ore, diagnosticul trebuie confirmat.
Evitaţi introducerea de substanţe contaminante în flacon în timpul utilizării. Flaconul trebuie inspectat vizual pentru a se detecta orice particule străine şi/sau un aspect fizic anormal. În cazul în care se observă oricare dintre acestea, aruncaţi flaconul.

4.10. Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz
La bovine, injecţiile subcutanate cu 10, 30 şi 50 mg tilmicozin/kg greutate corporală, repetate de trei ori într-un interval de 72 de ore, nu au cauzat decese. Conform aşteptărilor, s-a dezvoltat edem la locul de injectare. Singura leziune observată la autopsie a fost necroza miocardului în grupul tratat cu 50 mg/kg greutate corporală.

Dozele de 150 mg/kg greutate corporală, administrate subcutanat într-un interval de 72 de ore, au cauzat decesul. S-a observat edemul la locul de injectare, iar la autopsie, singura leziune identificată a fost o necroză uşoară a miocardului. Alte simptome observate au fost: dificultate de mişcare, reducerea apetitului alimentar şi tahicardie.

La ovine, injecţiile unice (aproximativ 30 mg tilmicozin/kg greutate corporală) pot cauza o creştere uşoară a ritmului respirator. Dozele mai ridicate (150 mg tilmicozin/kg greutate corporală) au cauzat ataxie, letargie şi incapacitatea de ridicare a capului.

"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Decesele au survenit după o injecţie intravenoasă unică cu 5 mg tilmicozin/kg greutate corporală la bovine şi cu 7,5 mg tilmicozin/ kg greutate corporală la ovine.

4.11. Perioada de aşteptare
Bovine:
Carne şi organe: 70 zile
Lapte: 36 zile

Dacă medicamentul de uz veterinar este administrat vacilor în perioada de repaus mamar sau junincilor de lapte gestante (în conformitate cu secţiunea 4.7 de mai sus), laptele nu trebuie să fie utilizat pentru consum uman timp de 36 de zile după fătare.

Ovine:
Carne şi organe: 42 zile
Lapte: 18 zile
Dacă medicamentul de uz veterinar este administrat oilor în perioada de repaus mamar sau oilor gestante (în conformitate cu secţiunea 4.7 de mai sus), laptele nu trebuie să fie utilizat pentru consum uman timp de 18 zile după fătare.

5. PROPRIETATI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Antibacteriene pentru uz sistemic, macrolide.
ATCvet code: QJ01FA91

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Tilmicozin este un antibiotic semisintetic, cu acţiune în principal bactericidă, din grupul macrolidelor. Se consideră că afectează sinteza proteinelor. Are acţiune bacteriostatică, însă poate fi bactericid la concentraţii ridicate.

Această activitate antibacteriană este predominant împotriva microorganismelor Gram-pozitive, cu activitate împotriva anumitor microorganisme Gram-negative şi infecţiilor cu *Mycoplasma* de origine bovină şi ovină. În special, activitatea sa a fost demonstrată împotriva următoarelor microorganisme: *Mannheimia, Pasteurella, Actinomyces (Corynebacterium), Fusobacterium, Dichelobacter, Staphylococcus,* şi organisme *Mycoplasma* de origine bovină şi ovină.
Concentraţia minimă inhibitorie măsurată în tulpini de teren europene recent izolate (2009-2012), derivate din boala respiratorie bovină.

Specia de bacterii	Interval CMI (µg/ml)	CMI_{50} (µg/ml)	CMI_{90} (µg/ml)
P. multocida	0,5- > 64	4	8
M. haemolytica	1 - 64	8	16

REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Institutul pentru Standarde Clinice şi de Laborator (CLSI) a stabilit criteriile de interpretare pentru tilmicozin împotriva *M. haemolytica* de origine bovină şi, în mod specific, pentru boala respiratorie bovină, drept ≤8 µg/ml = susceptibil, 16 µg/ml = intermediar şi ≥ 32 µg/ml = rezistent. În acest moment, CLSI nu deţine criterii de interpretare pentru *P. multocida* de origine bovină; cu toate acestea, institutul deţine criterii de interpretare pentru *P. multocida* de origine porcină, în mod specific pentru boala respiratorie porcină, formulate ca ≤16 µg/ml = susceptibil şi ≥ 32 µg/ml = rezistent.
Dovezile ştiinţifice sugerează că macrolidele acţionează în mod sinergetic împreună cu sistemul imunitar al gazdei. Macrolidele par să sporească distrugerea fagocitară a bacteriilor.
După administrarea orală sau parenterală de tilmicozin, principalul organ ţintă pentru toxicitate este inima. Principalele efecte cardiace sunt creşterea ritmului cardiac (tahicardie) şi scăderea contractilităţii (acţiune inotropă negativă). Toxicitatea cardiovasculară poate fi cauzată de blocarea canalelor de calciu.
La câini, tratamentul cu $CaCl_2$ a demonstrat un efect pozitiv asupra stării inotrope ventriculare stângi după administrarea de tilmicozin şi unele modificări ale tensiunii arteriale vasculare şi ale ritmului cardiac.
Dobutamina combate parţial efectele inotrope negative induse de tilmicozin la câini. Antagoniştii beta-adrenergici, cum ar fi propanolol, exacerbează acţiunea inotropă negativă a tilmicozinului la câini. La porcine, injecţia intramusculară cu 10 mg tilmicozin/kg greutate corporală a cauzat accelerarea respiraţiei, emeză şi convulsii; 20 mg/kg greutate corporală au dus la mortalitatea a 3 din 4 porci, iar 30 mg/kg greutate corporală au cauzat decesul tuturor celor 4 porci testaţi. Injecţia intravenoasă cu 4,5. până la 5,6 mg tilmicozin/kg greutate corporală, urmată de o injecţie intravenoasă cu 1 ml epinefrină (1/1000) de 2 până la 6 ori, a dus la decesul tuturor celor 6 porci injectaţi. Porcii care au primit 4,5 până la 5,6 mg tilmicozin/kg greutate corporală intravenos, fără epinefrină, au supravieţuit toţi. Aceste rezultate sugerează că administrarea intravenoasă de epinefrină poate fi contraindicată.
S-a observat rezistenţa încrucişată între tilmicozin şi alte macrolide şi lincomicină.

5.2. Particularităţi farmacocinetice

Absorbţie: Au fost desfăşurate mai multe studii. Rezultatele arată că, atunci când se administrează conform recomandărilor la viţei şi ovine, prin injecţie subcutanată în partea dorso -laterală a toracelui, principalii parametri sunt:

	Rata dozei	T_{max}	C_{max}
Bovine: Viţei nou născuţi	10 mg/kg greutate corporală	1 ora	1,55 µg/ml
Bovine din staţii de creştere	10 mg/kg greutate corporală	1 ora	0,97 µg/ml
Ovine: Animale de 40 kg	10 mg/kg greutate corporală	8 ore	0,44 µg/ml
Animale de 28-50 kg	10 mg/kg greutate corporală	8 ore	1,18 µg/ml

"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 855 071

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Distribuţie: După injecţia subcutanată, tilmicozin este distribuit în întregul corp, dar niveluri în special ridicate se găsesc în plămâni.
Biotransformare: Se formează mai mulţi metaboliţi, cel predominant fiind identificat drept T1 (N-demetil tilmicosin). Cu toate acestea, marea parte din tilmicozin este excretată nemodificată.
Eliminare: După injecţia subcutanată, tilmicozin este excretat în principal prin bilă în fecale, însă o proporţie mică este excretată prin urină. Timpul de înjumătăţire după injecţia subcutanată la bovine este de 2-3 zile.

6. PARTICULARITATI FARMACEUTICE

6.1.Lista excipienţilor
Propilen glicol (E1520)
Acid fosforic (pentru ajustare pH)
Apă pentru preparate injectabile

6.2. Incompatibilităţi majore
În absenţa studiilor de compatibilitate acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinare.

6.3. Perioada de valabilitate
Perioada de valabilitate a medicamentelor de uz veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.
Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului original: 28 zile.

6.4. Condiţii speciale pentru depozitare:
A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C.
A nu se refrigera.
A se feri de îngheţ.
A nu se expune la lumina solara directă.

6.5. Natura şi compoziţia ambalajului primar
Flacoane din polipropilenă închise cu dop din cauciuc brombutilic şi sigilate cu capsă din aluminiu x 50 ml, x 100 ml, x 250 ml.
Este posibil să nu fie comercializate toate dimensiunile de ambalaje.

6.6. Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
Medicamentul de uz veterinar neutilizat sau deşeurile provenite din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
Medicamentul de uz veterinar nu trebuie aruncat în ape reziduale sau sisteme de canalizare.

REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 856-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
S.C. CRIDA PHARM S.R.L.
Str. Intrarea Vagonetului nr. 2, bl. 101, ap. 47, Sector 6, București, România.
Tel. /fax.+4021 430.43.99 , Email: office@cridapharm.ro

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
220068

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)
25.11.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
11.2022

"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 856-071, 022 856-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md