

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Dezacid

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml de Dezacid conține:

Substanța activă:

Gentamicină sulfat - 4 mg,

Acid succinic - 1 mg.

Excipienți:

Fosfat de monopotasiu, fosfat de sodiu disubstituit 2-apos, polietilenglicol 400 (PEG-400), apă distilată, clorură de sodiu.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Picături oftalmice și intranazale.

Soluție transparentă incoloră.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

Câini, pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Dezacid se indică la câini și pisici cu scop de profilaxie și tratament în caz de:

- conjunctivite acute și cronice, cheratite, cheratoconjunctivite, blefarite, iridociclite, dacriocistite, ulcere septice a corneei, rinite;
- pentru înlăturarea microflorei bacteriene secundare în tratamentul bolilor virale ale ochilor și cavității nazale;
- pentru sanarea plăgilor de pe conjunctivă, pleoape, nas și cavităților nazale;
- în cazul infecțiilor bacteriene în urma traumelor sau extragerea corpurilor străine din ochi sau nas.
- în cazul infecțiilor bacteriene oculare și nazale pre - și post operator;
- în dermatite de etiologie bacteriană a suprafeței în jurul ochilor și a nasului.

4.3 Contraindicații:

Sensibilitatea individuală sporită la componentele medicamentului (inclusiv în anamneză).

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Administrarea medicamentului Dezacid tineretului cu vârsta sub 1 an, se efectuează doar sub supravegherea medicului veterinar.

A nu se administra animalelor productive.



4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

La omiterea unei sau mai multor doze, tratamentul se reia cât de repede posibil conform schemei și dozelor de administrare.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu medicamentul Dezacid, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

După utilizarea medicamentului spălați-vă mâinile cu apă caldă și săpun.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul direct cu medicamentul.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau instrucțiunea).

Se interzice fumatul și consumul de alimente sau băuturi.

4.6 Reacții adverse:

Reacții adverse și complicații la administrarea conform instrucțiunii date, nu apar. În caz de sensibilitate sporită și apariția reacției alergice, administrarea se stopează și se recurge la terapie simptomatică cu antihistaminice.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Administrarea medicamentului Dezacid în perioada de gestație și lactație se efectuează doar sub supravegherea medicului veterinar.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt date.

4.9 Doza și calea de administrare:

Înainte de folosire flaconul se agită intens.

Se igienizează regiunea din jurul ochilor/nasului cu un tampon umezit cu medicamentul dat.

În tratamentul maladiilor bacteriene acute și cronice oculare și nazale, pentru înlăturarea microflorei bacteriene secundare în cazul tratamentului maladiilor virale, Dezacid se picură în sacul conjunctival al ambilor ochi sau ambele nări de 3-4 ori pe zi, timp de 5-10 zile în doze indicate în tabel:

Specia și greutatea animalului	Numărul picături pentru o instilare
Câini de la 10 kg și mai mari	3
Câini sub 10 kg greutate corp	2
Pisici	1

Pentru sanare și dezinfectare a plăgilor conjunctivei, pleoapelor sau nasului, suprafața afectată se șterge ușor cu un servetel steril, umezit cu Dezacid, 1 dată pe zi, timp de 5-10 zile.

În cazul infecțiilor bacteriene în urma traumei sau pătrunderea corpurilor străini în ochi și nas, medicamentul se administrează animalului în cavitatea conjunctivală în ambii ochi, în nas, în ambele nări, în doze indicate în tabel, 4 ori pe zi, timp de 3 zile.

În cazul infecțiilor bacteriene oculare și nazale, pre - și post operator, se picură de 3 ori pe zi, timp de 3-5 zile în doze indicate în tabel.

În cazul dermatitelor a zonei din jurul ochilor și nasului de etiologie bacteriană, suprafața afectată se șterge cu un tampon umezit cu Dezacid, de 2-3 ori pe zi, timp de 5-10 zile.

4.10 Supradozare:

Nu au fost cazuri înregistrate.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: aminoglicozide în combinații.

Codul ATC: QS01AA20

5.1.2 Mecanism de acțiune

Mecanismul de acțiune bactericidă a gentamicinei constă în fixarea pe subunitățile ribozomale 30S ale celulei bacteriene și inhibarea sintezei proteice, producând perturbarea activității ARN - mesager. În concentrații mari dereglează funcția de barieră a membranei citoplasmatică și provoacă moartea microorganismului.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

Medicamentul posedă acțiune bactericidă, antiinflamatoare și de regenerare.

Gentamicină este un antibiotic din grupa aminoglicozidelor, activ față de bacteriile Gram-pozitive și Gram-negative, inclusiv *Pseudomonas aeruginosa*.

Acidul succinic este un reglator a metabolismului tisular, stimulează respirația tisulară, posedă acțiune antiinflamatoare și antioxidantă.

Acidul succinic este un reglator al metabolismului tisular, stimulează respirația celulară, are efecte antiinflamatorii și antioxidante.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Se recomandă respectarea termenilor și a dozelor indicate pentru a nu diminua eficiența terapeutică.

Medicamentul face parte din grupul medicamentelor puțin toxice (grupa IV de toxicitate conform GOST 12.1.007-76). În doze recomandate nu posedă acțiune iritantă.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

În urma administrării în cavitate conjunctivală sau intranazală, Dezacid pătrunde în lichidul intraocular și mucoasa intranazală și menține concentrația terapeutică pe parcursul a câteva ore.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Fosfat de monopotasiu, fosfat de sodiu disubstituit 2-apos, polietilenglicol 400 (PEG-400), apă distilată, clorură de sodiu.

6.2 Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate:

2 ani din data producerii.

După deschiderea flaconului - 25 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la $T^{\circ}C$ de la $0^{\circ}C$ până la $+25^{\circ}C$, în locuri inaccesibile copiilor.
A se păstra în locuri inaccesibile pentru copii.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon din polimer a câte 10 ml cu picurătoare și capac filetat securizat.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Medicamentul nefolosit se elimină conform reglementării locale, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

AO "Agrobioprom", 105064, Rusia, or. Moscova, str. Kazakova 6/1

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

220070

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

25.11.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2022

