

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

DEZACID

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO "Agrobioprom", 105064, Rusia, or. Moscova, str. Kazakova 6/1

AO "Agrobioprom", 143985, reg. Moscova, Balașiha, șos. Poltavskoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Dezacid

Picături oftalmice și intranazale

1 ml de Dezacid conține:

Substanța activă:

Gentamicină sulfat - 4 mg,

Acid succinic - 1 mg.

Excipienți:

Fosfat de monopotasiu, fosfat de sodiu disubstituit 2-apos, polietilenglicol 400 (PEG-400), apă distilată, clorură de sodiu.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Dezacid se indică la câini și pisici cu scop de profilaxie și tratament în caz de:

- conjunctivite acute și cronice, cheratite, cheratoconjunctivite, blefarite, iridociclite, dacriocistite, ulcere septice a corneei, rinite;
- pentru înlăturarea microflorei bacteriene secundare în tratamentul bolilor virale ale ochilor și cavității nazale;
- pentru sanarea plăgilor de pe conjunctivă, pleoape, nas și cavităților nazale;
- în cazul infecțiilor bacteriene în urma traumelor sau extragerea corpurilor străine din ochi sau nas.
- în cazul infecțiilor oculare și nazale pre - și post operator;
- în dermatite de etiologie bacteriană a suprafeței în jurul ochilor și a nasului.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitatea individuală sporită la componentele preparatului (inclusiv în anamneză).

5. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse și complicații la administrarea conform instrucțiunii date, nu apar. În caz de sensibilitate sporită și apariția reacției alergice, administrarea se stopează și se recurge la terapie simptomatică cu antihistaminice.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de folosire flaconul se agită intens.

Se igienizează regiunea din jurul ochilor/nasului cu un tampon umezit cu medicamentul dat.

În tratamentul maladiilor bacteriene acute și cronice oculare și nazale, pentru înlăturarea microflorei bacteriene secundare în cazul tratamentului maladiilor virale, Dezacid se picură în sacul conjunctival al ambilor ochi sau ambele nări de 3-4 ori pe zi, timp de 5-10 zile în doze indicate în tabel:

Specia și greutatea animalului	Numărul picături pentru o instilare
Câini de la 10 kg și mai mari	3
Câini sub 10 kg greutate corp	2
Pisici	1

Pentru sanare și dezinfectare a plăgilor conjunctivei, pleoapelor sau nasului, suprafața afectată se șterge ușor cu un șervețel steril, umezit cu Dezacid, 1 dată pe zi, timp de 5-10 zile.

În cazul infecțiilor bacteriene în urma traumei sau pătrunderea corpi străini în ochi și nas, medicamentul se administrează animalului în cavitatea conjunctivală în ambii ochi, în nas, în ambele nări, în doze indicate în tabel, 4 ori pe zi, timp de 3 zile.

În cazul infecțiilor bacteriene oculare și nazale, pre - și post operator, se picură de 3 ori pe zi, timp de 3-5 zile în doze indicate în tabel.

În cazul dermatitelor a zonei din jurul ochilor și nasului de etiologie bacteriană, suprafața afectată se șterge cu un tampon umezit cu Dezacid, de 2-3 ori pe zi, timp de 5-10 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C de la 0°C până la +25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

A se păstra în locuri inaccesibile pentru copii.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se elimină conform reglementării locale, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Administrarea medicamentului Dezacid tineretului cu vârsta sub 1 an, se efectuează doar sub supravegherea medicului veterinar.

A nu se administra animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

La omiterea unei sau mai multor doze, tratamentul se reia cât de repede posibil conform schemei și dozelor de administrare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu medicamentul Dezacid, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

După utilizarea medicamentului spălați-vă mâinile cu apă caldă și săpun.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau oricare dintre excipienți trebuie să evite contactul direct cu medicamentul.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau instrucțiunea).

Se interzice fumatul și consumul de alimente sau băuturi.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Administrarea medicamentului Dezacid în perioada de gestație și lactație se efectuează doar sub supravegherea medicului veterinar.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt date.

Supradozare:

Nu au fost cazuri înregistrate.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

12. PERIODA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

După deschiderea flaconului - 25 zile.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din polimer a câte 10 ml cu picurător și capac filetat securizat.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Camenița 4a

Tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR