

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

TUBERCULINĂ

purificată pentru mamifere

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OAO "BelVitunifarm",

211309, or. Dolja, str. Sovetskaia 26A, r. Vitebsk, reg. Vitebsk, Republica Belarus

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Tuberculină purificată pentru mamifere

Se prezintă ca o soluție transparentă, de culoare de la galben pal la maro deschis, fără incluziuni.

1 ml conține 20000 U.I de derivat proteic purificat de *Mycobacterium bovis* tulpina N8 cu masa moleculară 300-5 kDa, crescut pe mediu lichid, inactivat, ultrafiltrat și stabilizat.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pentru diagnosticul alergic in vivo al tuberculozei de tip bovin la animale mamifere.

4. CONTRAINDICAȚII

Este contraindicată inocularea în zone ale pielii cu leziuni traumatice, îngroșare cutanată, abcese, micoze, afectate cu acarieni sau helminti.

5. REACȚII ADVERSE

Nu este cazul.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, cervide, porcine, ovine, caprine, animale de blană

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de administrare a tuberculinei locul de injectare se tunde (în afară de caprine, ovine, carnișiere) și se prinde vertical un pliu de piele, se măsoară cu cutimetru grosimea pliului și se notează rezultatul. Pielea se tratează cu alcool etilic de 70%.

La bovine - vacilor (indiferent de termenul gestației), tineretului bovin (mai mare de 6 săptămâni), cerbilor, antilopilor – se administrează intradermic în treimea mijlocie a gâtului, taurilor - în pliul caudal.

Tuberculina se administrează în doză de 4000 UI, într-un volum de 0,2 ml, în centrul ariei tunse, cu o seringă gradată cu un ac scurt steril cu o capacitate de 1 ml, se plasează înclinat spre exterior cu marginea teșită a acului, în profunzimea pielii, sau cu un dispozitiv fără ac.

O injectare corectă se confirmă prin formarea la locul inoculării a unei umflături mici de mărimea unui bob de mazăre.

Citirea reacției se realizează peste 72 ± 3 ore de la inoculare prin examinare, palpare și măsurare a pliului pielii la locul de inoculare, datele obținute se înregistrează.

Interpretarea rezultatelor:

Reacție negativă – se consideră atunci, când creșterea a grosimii pliului cutanat este mai mică decât 2 mm, fără semne clinice: edem, exsudat, necroză, durere sau reacție inflamatorie a ganglionilor și vaselor limfatice în această regiune.

Reacție neconcludentă – se consideră atunci, când creșterea a grosimii pliului cutanat este mai mare decât 2 mm dar mai mică decât 4 mm și fără semne clinice: edem, exsudat, necroză, durere sau inflamație a ganglionilor și vaselor limfatice în această regiune.

Reacție pozitivă – se consideră atunci, când creșterea a grosimii pliului cutanat este de 4 mm și mai mare sau se observă semne clinice: edem, exsudat, necroză, durere sau inflamație a ganglionilor și vaselor limfatice în regiune inoculată.

În cazul realizării testului comparativ simultan, inocularea tuberculinei se efectuează intradermic în treimea mijlocie a gâtului, în doză de 4000 UI, în volum de 0,2 ml, iar din altă latură a gâtului simetric se inoculează PPD tuberculina aviară în doze de 10000 UI, în volum de 0,2 ml sau alergen complex de micobacterii atipice (ACM) în doză de 1350 UI, în volum de 0,2 ml.

Inocularea se efectuează cu ace și seringi diferite.

Rezultatul testului comparativ simultan se citește peste 72 ± 3 ore, se palpează și se măsoară pliul pielii la locul de inoculare, datele obținute se înregistrează.

Reacție pozitivă – se consideră atunci, când reacția la tuberculină purificată pentru mamifere este mai mare decât cea la tuberculina aviară (de 4 mm și mai mult) sau în locul inoculării se observă semne clinice de edem inflamator.

Reacție neconcludentă – se consideră atunci, când reacția pozitivă sau neconcludentă la tuberculină purificată pentru mamifere este mai mare decât reacția la tuberculina aviară cu 1-4 mm, fără semne clinice de edem inflamator.

Reacție negativă - se consideră atunci, când reacția negativă sau pozitivă, sau neconcludentă la tuberculina purificată pentru mamifere este egală sau mai mică în comparație cu reacția la tuberculina aviară, și fără semne de edem inflamator în locuri de inoculare ale ambelor alergeni.

La porcine - tuberculina se administrează în doză de 4000 UI, în volum de 0,2 ml, intradermic, pe suprafața exterioară a urechii, la distanța de 1,5 - 2 cm de la baza ei; purceilor cu vârsta de 2-3 luni se admite inocularea tuberculei în regiunea lombară, la distanța de 5-8 cm de la coloana vertebrală cu un dispozitiv fără ac. Citirea reacției se face peste 48 ore.

Reacția se consideră pozitivă în caz, dacă în locul inoculării a tuberculei se formează o umflătură.

La Caprine, ovine - tuberculina se administrează cu seringă în doză de 4000 UI, în volum de 0,2 ml în pleoapa inferioară, la distanța de 1,5-2 cm de la margine. Reacția se citește peste 48 ore comparând starea ambilor ochi.

Reacția se consideră pozitivă în caz, dacă se observe diferența între pleopele dreapta și stânga.

Se admite administrarea tuberculei în regiunea interioară a coapsei cu dispozitivul fără ac în doză de 4000 UI, în volum de 0,2 ml.

Se citește reacția peste 48 ore și se notează rezultatul.

Reacție se consideră pozitivă în caz, dacă în locul inoculării a tuberculei se formează o umflătură.

La animale de blană - tuberculina se administrează cu seringă în doză de 2000 UI, în volum de 0,1 ml se inoculează în pleoapa superioară.

Reacția se citește peste 48 ore comparând starea pleoapelor dreapta și stînga.

Reacția pozitivă se consideră atunci, când se observe diferența între pleopele dreapta și stînga.

La cabaline și alte specii de ecvidee - se folosește testul oftalmic. Tuberculina în cantitate de 3-5 picături se administrează cu o pipetă sau cu o seringă fără ac, se trage pleoapa inferioară și se picură pe conjunctiva pleoapei inferioare sau pe suprafața corneei.

Rezultatele testului oftalmic se citesc peste 6, 9, 12 și 24 ore.

Pentru a citi corect reacția, se trage pleoapa inferioară și se examinează sacul conjunctival, deoarece reacția poate să se limiteze doar cu formarea pe termen scurt a unui secret purulent sub formă de boabe.

Reacție pozitivă - se considere atunci, când secretul mucopurulent sau purulent se acumulează în sacul conjunctival sau care se elimină sub formă unui cordon din colțul interior al ochiului, hiperemie și edem al conjunctivei.

Administrarea repetată a tuberculei se permite nu mai devreme de 42 zile.

Supradozare

Nu sunt date înregistrate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 24 ore.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Tuberculina purificată pentru mamifere cu concentrația de 20000 U.I se ambalează în flacoane sterile din sticlă a câte 10 și 20 ml, cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL "Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Camenița 4a

Tel/fax +373 022 855-071

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

