Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Oxitetraciclină clorhidrat 20%

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.
-Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
-Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
-Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
-Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
-Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OAO"BelVitunifarm",
211309, or. Dolja, str. Sovetskaia 26A, r. Vitebsk, reg. Vitebsk, Belarus

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Oxitetraciclină clorhidrat 20%- pulbere perorală.
Pulbere de culoare galbenă pal până la galbenă intens.

În 100 g de medicament se conține:
Substanța activă:
Oxitetraciclină clorhidrat - 20 g.
Excipienți:
Glucoză monohidrat.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Oxitetraciclină clorhidrat 20%- se indică în tratamentul vițeilor, purceilor și a păsărilor în cazul colibacteriozei, pasteurelozei, salmonelozei, micoplasmozei, actinomicozei, infecțiilor cu stafilococi, rickettsii, și alte afecțiuni provocate de microorganisme sensibile la oxitetraciclină.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra animalelor cu sensibilitate sporită la grupa tetraciclinelor, în cazul disfuncțiilor hepatice și renale.

5. REACȚII ADVERSE

Administrarea Oxitetraciclinei clorhidrat 20% în doze recomandate nu provoacă reacții adverse.
În caz de apariție a reacției alergice (eritem, vomă) administrarea se stopează și se recurge la medicamente antihistaminice și medicamente cu conținut de calciu.

6. SPECII ȚINTĂ

Viței, purcei, pui (găini, curci, rațe).

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Oxitetraciclină clorhidrat 20% se administrează oral în apă de băut sau în furaj, timp de 3-5 zile consecutive.

Viţei - 0,05-0,1 g/kg masă corp,
Purcei - 0,075-0,150 g/kg masă corp,
Păsări - 0,1-0,25 g/kg masă corp, de două ori pe zi.

Păsărilor medicamentul poate fi administrat în raport de 25 g/5 litri apă.
Este necesar ca apa de băut medicamentată să fie singură sursă de apă de băut pe toată perioada tratamentului.
O nouă cantitate de apă medicamentată trebuie să fie proaspăt preparată la fiecare 24 de ore.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Carne-20 zile de la ultima administrare.
Carcasele animalelor sacrificate înainte de termenul indicat se dau în hrana animalelor carnivore.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe şi umiditate, separat de produse alimentare şi furaje, la T^{0}C de la 0^{0}C până la +25^{0}C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar nefolosit se elimină conform reglementării locale.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Nu sunt.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Particularităţi deosebite în acţiunea medicamentului de uz veterinar la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.
Utilizarea în exces, inclusiv utilizarea medicamentului de uz veterinar cu abatere de la instrucţiunile menţionate în RCM, poate creşte prevalenţa rezistenţei bacteriene la oxitetraciclină.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul lucrului cu Oxitetraciclină clorhidrat 20%-, e important de respectat regulile comune de igienă personală şi a tehnicii securităţii prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.
Persoanelor cu hipesensibilitate cunoscută la substanţa activă se recomandă evitarea contactului direct cu Oxitetraciclină clorhidrat 20%.
În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, se spală din abundenţă cu apă.
În caz de îngerare sau apariţie a reacţiilor alergice e necesar de adresat la o instituţie medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).
În timpul lucrului se interzice fumatul,consumul de alimente şi băuturi.
La finisarea lucrului mîinile se spală cu apă şi săpun.

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat
Nu se administrează la păsările de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
A nu se administra concomitent cu aminoglicozidele, penicilinele, cefalosporinele, eritromicina, sulfonamidele și medicamente cu conținut de calciu, aluminiu și magneziu.

Supradozare
Supradozarea poate provoca disbacterioză.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare:
2 ani din data producerii.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR
Pungi duble din polietilenă termosudate a câte 100; 500; 1000; 5000g sau în pungi din polietilenă metalizată a câte100; 500;1000g.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI
12.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA
SRL" Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Cameniţa 4a
Tel/fax +373 022 855-071
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. • "ZOOFARMAGRO" S.R.L. • "ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md