

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Unguent FUNGIBAK-IAM

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALEPRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service”
str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
Unguent FUNGIBAK-IAM

1 g de medicament conține

Substanțe active:

Acid salicilic - 50,0 mg ;
Precipitat de sulf - 100,0 mg;
Oxid de zinc - 100,0 mg;
Gudron de mesteacăn - 50,0 mg;
Gumă de terebentină - 75,0 mg;
Ihtiol - 50,0 mg.

Lista excipienților:

Lanolină anhidră, vazelină veterinară.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Extern, în tratamentul complex la bovine, cabaline, caprine, porcine, câini și pisici, în microsporie, trihofitie (pecingine), dermatofiloză, leziuni ale copitelor în necrobacterioze la animale domestice, pododermatita ulcerativă, miozite, eczeme, ulcere, miozite reumatice, dermatite și dermatoze.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se aplică în cazul animalelor cu sensibilitate individuală crescută (alergie) la substanțele active ale unguentului, slăbite sau epuizate.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.



6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, caprine, porcine, câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru uz extern.

Unguentul se aplică într-un strat subțire pe zona afectată a pielii și la o distanță de 3 cm în jurul acesteia, fără a îndepărta mai întâi solzii și tăia părul.

Medicamentul este frecat ușor în piele cu mână, în mănușe de cauciuc. Zonele afectate sunt tratate de 1-2 ori pe zi timp de 4-5 zile. De regulă, după 7-10 zile, zonele afectate ale pielii sunt eliberate de solzi, se observă o creștere a părului și semnele clinice ale bolii dispar.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccessibil copiilor, plasat la temperaturi de la +2 °C până la +25 °C.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Medicamentul de uz veterinar nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

Nu contaminați lacurile cursurile de apă sau canalizarea cu medicamentul de uz veterinar sau cu ambalajul acestuia.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

A se aplica cu atenție la pisici. Atunci când este aplicat pe piele la pisici se va preveni linsul.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se evita aplicarea unguentului pe mucoase.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Acest unguent este iritant pentru ochi și mucoase. De aceea, contactul acestui unguent cu ochii sau gura trebuie evitat. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active ale unguentului sau excipienți, trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar. În timpul aplicării unguentului se vor purta mănuși de protecție.

Utilizare în perioada de gestație, și lactație:

Nu sunt.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Unguentul este incompatibil cu oxidanții puternici (permanganat de potasiu etc.).

Supradozare

Nu sunt.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare:
2 ani.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Recipiente din polimer cu un conținut de 20, 50, 100, 200 și 300 g, tuburi laminate de 50, 100 și 200 g, borcane de sticlă sau polimer de 50, 100 și 200 g, 1, 2, 5, 10, 20 kg.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

