

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Unguent FUNGIBAK-IAM

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 g de medicament conține

Substanțe active:

Acid salicilic - 50,0 mg ;

Sulf precipitat - 100,0 mg;

Oxid de zinc - 100,0 mg;

Gudron de mesteacăn - 50,0 mg;

Terebentină - 75,0 mg;

Ihtiol - 50,0 mg.

Excipienți:

Lanolină anhidră, vazelină veterinară.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Unguent

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Bovine, cabaline, caprine, porcine, câini și pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Extern, în tratamentul complex la bovine, cabaline, caprine, porcine, câini și pisici, în microsporie, trihofitie (pecingine), dermatofiloză, leziuni ale copitelor în necrobacterioze la animale domestice, pododermatita ulcerativă, miozite, eczeme, ulcere, miozite reumatice, dermatite și dermatoze.

4.3 Contraindicații:

Nu se aplică în cazul animalelor cu sensibilitate individuală crescută (alergie) la substanțele active ale unguentului, slăbite sau epuizate.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

A se aplica cu atenție la pisici. Atunci când este aplicat pe piele la pisici se va preveni linsul.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se evita aplicarea unguentului pe mucoase.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Acest unguent este iritant pentru ochi și mucoase. De aceea, contactul acestui unguent cu ochii sau gura trebuie evitat. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active ale unguentului sau excipienți, trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În timpul aplicării unguentului se vor purta mănuși de protecție.

4.6 Reacții adverse:

Nu sunt.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, și lactație:

Nu sunt.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Unguentul este incompatibil cu oxidanții puternici (permanganat de potasiu etc.).

4.9 Doză și calea de administrare

Pentru uz extern.

Unguentul se aplică într-un strat subțire pe zona afectată a pielii și la o distanță de 3 cm în jurul acesteia, fără a îndepărta mai întâi solzii și tăia părul.

Medicamentul este frecat ușor în piele cu mână, în mănușe de cauciuc. Zonele afectate sunt tratate de 1-2 ori pe zi timp de 4-5 zile. De regulă, după 7-10 zile, zonele afectate ale pielii sunt eliberate de solzi, se observă o creștere a părului și semnele clinice ale bolii dispar.

4.10 Supradozare

Nu sunt.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: ATC vet QDO3A, medicament de uz veterinar dermatologic.

5.1.2 Mecanism de acțiune

Unguentul antimicotic acționează blocând căile enzimatică, de sinteză, creștere, reproducere a fungilor și bacteriilor.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

Unguentul are un efect fungicid și bactericid pronunțat datorită proprietăților sinergice ale componentelor. Baza de unguent favorizează pătrunderea componentelor active ale medicamentului în piele, care distrug agenții patogeni existenți pe toată grosimea leziunii.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică

Fungibak – Iam unguent pentru uz extern, prezintă o înaltă eficiență și siguranță de utilizare la animalele domestice. Unguentul poate fi cu ușurință administrat în orice condiții. Aceste aspecte diminuează în sine costul măsurilor de tratament și profilaxie, precum și riscurile de apariție a reacțiilor adverse.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Absorbția sistemică este foarte mică, concentrația plasmatică maximă fiind sub limita de detecție, ceea ce reflectă faptul că aplicarea topică nu determină efecte sistemice evidente sau reacții adverse generale. Absorbția trans cutanată poate fi crescută în cazul pielii lezate.



6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

lanolină anhidră, vazelină veterinară.

6.2 Incompatibilități

Unguentul este incompatibil cu oxidanții puternici ca permanganat de potasiu.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, la temperaturi de la +2 °C până la +25 °C.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Recipiente din polimer cu un conținut de 20, 50, 100, 200 și 300 g, tuburi laminate de 50, 100 și 200 g, borcane de sticlă sau polimer de 50, 100 și 200 g, 1, 2, 5, 10, 20 kg.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Medicamentul de uz veterinar nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

Nu contaminați lacurile cursurile de apă sau canalizarea cu medicamentul de uz veterinar sau cu ambalajul acestuia.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500

tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87

e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

220090

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

07.12.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2022

