



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Vaccin RABBIVAC-B

Vaccin contra mixomatozei la iepuri atenuat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

OOO "Torgovîi dom "BiAgro", Rusia
600014, or. Vladimir, str. Lakina, 4-B

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Vaccin RABBIVAC-B, vaccin contra mixomatozei la iepuri atenuat
Liofilizat pentru prepararea unei suspensii injectabile

O doză imunizantă de vaccin (1 cm³) conține:

Substanța activă:

Virusul viu atenuat al mixomatozei iepurelui (tulpina № B-82) nu mai puțin de 500 ID₅₀

Excipienți:

Lapte degresat și hidrolizat enzimatic al proteinelor sanguine

Vaccinul prezintă o masă uscată poroasă de culoare crem-bej.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Vaccinul RABBIVAC-B este indicat pentru profilaxia mixomatozei la iepuri în zone favorabile, cât și în gospodăriile suspecte și nefavorabile la această boală.

Debutul imunității: 5-9 zile după vaccinare.

Durata imunității: 12 luni după vaccinare.

4. CONTRAINDICAȚII

Se interzice vaccinarea animalelor clinic bolnave și/sau slăbite.





5. REACȚII ADVERSE

La administrarea vaccinului conform indicațiilor prospectului, efecte secundare și complicații nu s-au înregistrat. În cazuri sporadice, vaccinul poate provoca o reacție alergică. În acest caz, se întrerupe utilizarea vaccinului, iar animalelor li se administrează antihistaminice sau alt tratament simptomatic.

În cazul vaccinării animalelor aflate în perioada de incubație a bolii, este posibilă moartea acestora.

6. SPECII ȚINTĂ

Iepuri

7. POSOLOGIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Vaccinul se administrează prin injectare intramusculară în partea posterioară a coapsei sau prin injectare subcutanată, în volum de 1 cm³, cu respectarea tuturor regulilor de asepsie și antisepsie. Înainte de utilizare, vaccinul se dizolvă cu apă distilată în proporție de 1 cm³ de apă la o doză vaccinală.

În gospodăriile favorabile animalele se vaccinează la vârsta de 30-45 zile, o singură dată.

În gospodăriile nefavorabile și suspecte animalele se vaccinează o dată la vârsta de 30-45 zile, cu revaccinare peste 3 luni.

Revaccinarea animalelor se efectuează la fiecare 12 luni.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

Carnea și produsele obținute de la sacrificarea animalelor imunizate se realizează fără restricții, indiferent de momentul vaccinării.

După 2-3 săptămâni de la vaccinare, animalele imunizate pot fi transportate și mutate în alte gospodării.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Vaccinul este păstrat și transportat în ambalajul închis al producătorului, în locuri uscate, ferite de razele solare directe, la temperaturi +2°C până la +8°C.

A se păstra în locuri inaccesibile pentru copii.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Flacoanele cu vaccin fără etichetă, cu termenul de valabilitate expirat, cu defecte de ambalare, cu culoarea sau consistența schimbată a medicamentului de uz veterinar, cu prezența impurităților, precum și resturile de vaccin neutilizate timp de 1 oră după deschiderea flaconului, vor fi nimicite prin fierbere timp de 30 min sau prelucrate cu soluție alcalină de 2% sau soluție de cloramină de 5% (1:1) timp de 30 min.

Utilizarea vaccinului dezinfectat nu necesită măsuri speciale de protecție.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

A se evita încălcarea schemelor de vaccinare, întrucât acest fapt poate antrena reducerea eficacității vaccinului contra mixomatozei la iepuri.



În cazul omiterii următoarei administrări a vaccinului, este necesar de efectuat imunizarea cât de curând posibil.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Particularități deosebite la administrarea primară sau la revaccinare nu s-au înregistrat.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale

În timpul lucrului cu vaccinul RABBIVAC-B trebuie de respectat regulile generale de asepsie, de igienă personală și tehnica securității, prescrise pentru lucrul cu medicamentele de uz veterinar. Persoanele care efectuează vaccinarea trebuie să fie dotate cu echipament de protecție (cizme de cauciuc, halat, pantaloni, bonetă, mănuși de cauciuc) și asigurate cu mijloace individuale de protecție: ochelari de tip închis. În locurile de vaccinare trebuie să fie prezentă trusa medicală. În caz de contact accidental cu pielea și/sau mucoasele, se recomandă de spălat abundent cu apă. În cazul injectării accidentale a vaccinului unei persoane, se recomandă de prelucrat locul injectării cu soluție de alcool etilic 70% și de solicitat imediat sfatul medicului, cu prezentarea prospectului sau etichetei a medicamentului de uz veterinar.

Perioada de gestație și lactație

Acțiune specifică a vaccinului la administrarea acestuia femelelor gestante și în lactație nu s-a înregistrat.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Se interzice administrarea vaccinului RABBIVAC-B împotriva mixomatozei la iepuri concomitent cu alte preparate imunobiologice, precum și se interzice de vaccinat animalele cu alte vaccinuri în termen de 14 zile până la și după următoarea imunizare.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot)

Simptome de manifestare a mixomatozei la iepuri sau alte simptome patologice în cazul supradozării vaccinului nu s-au stabilit.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate, în cazul respectării condițiilor de păstrare și transportare - 18 luni de la data fabricației.

Se interzice utilizarea vaccinului RABBIVAC-B după expirarea termenului de valabilitate.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Vaccinul este ambalat în flacoane de sticlă sterile de 2 cm³ (10 doze vaccinale), închise ermetic cu dop de cauciuc și capace de aluminiu.

Flacoanele cu vaccin sunt ambalate în cutii.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

