Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Phertadin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
-Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
-Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
-Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
-Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. Denumirea şi adresa deţinătorului certificatului de înregistrare şi ale producătorului/fabricantului responsabil pentru eliberarea medicamentului de uz veterinar
Compania cu răspundere limitată "Belekotekhnika", per. Promyshlenniy 9, 222823, p. Svisloci, districtul Pukhovicischii, regiunea Minsk, Republica Belarus.
Telefon: +375 1713 70-716, e-mail: tam.korn@beleka.by

2. Denumirea medicamentului de uz veterinar, concentraţia şi forma farmaceutică ale acestuia
Phertadin (Phertadinum).
Soluţie injectabilă
Medicamentul reprezintă o soluţie transparentă spre culoarea galbenă.

În 1 ml de medicament se conţine: 0,25 mg cloprostenol de sodiu, substanţe auxiliare (acid citric, hidroxid de sodiu, fenol) şi un solvent (apă purificată)

3. Indicaţii terapeutice (*pe specie ţintă*)
Medicamentul este utilizat pentru a regla funcţia de reproducere şi pentru a trata vacile şi scroafele cu boli ale organelor de reproducere. Medicamentul este prescris pentru tratamentul vacilor şi scroafelor cu corp galben persistent, chisturi luteale şi foliculare, hipofuncţie ovariană (călduri liniştite, ciclu anovulator), subinvoluţie a uterului, endometrită, precum şi pentru sincronizarea căldurilor la vaci şi juninci, inducerea şi sincronizarea fătării, întreruperea sarcinii la animale.

4. Contraindicaţii
Medicamentul este contraindicat în cazul în care animalele prezintă sensibilitate individuala crescută la componentele medicamentului.

5. Reacţii adverse
În doze recomandate nu au fost observate careva efecte adverse. (vezi pct.11)

6. Specii ţinta
Bovine şi porcine.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

7. Posologie pentru fiecare specie, metoda, modul de administrare

- În sincronizarea căldurilor la vaci şi junci - 2ml/per animal de două ori cu un interval de 10 zile.

Prima doză de medicament se administrează în orice fază a ciclului sexual la vaci (perioada 40 până la 60 de zile după naştere). În absenţa etapei de excitare în a 11-a zi după prima introducere, trebuie administrată a doua doză, iar în a 14-a zi (72-76 ore după a doua injecţie), se va efectua inseminare artificială (indiferent de simptome de căldură sexuală) cu inseminare repetata si a 15-a zi;

- În caz de corpul galben persistent -2ml/per animal, iar inseminarea artificiala se efectueaza la primele semne de călduri. Dacă căldurile nu au început, atunci 2ml de medicament trebuie readministraţi în a 11-a zi după prima injecţie, urmată de inseminare la 72-76 de ore mai târziu.
- Pentru tratamentul cu chisturi luteale ovariene la vaci se administrează o dată 4ml/per animal, şi concomitent se injectează subcutanat într-o doză de 2,5-3,0 mii unităţi (u.ş.) ser de iapă gestantă.
- Pentru tratamentul chisturilor ovariene foliculare, se injectează subcutanat gonadotropina corionica în doză de 4-5 mii. UI sau intramuscular surfagon 50 mcg timp de trei zile, După 10-12 zile, animalele care nu vin în călduri sunt injectate cu medicamentul la o doză de 2ml/per animal.
- Pentru tratamentul endometritei postpartum şi subinvoluţia uterului, medicamentul se injectează de două ori cu un interval de 10-11 zile în doză de 2ml/per animal, cu prescrierea concomitentă de medicamente etiotrope, patogenetice şi terapie simptomatică.

La scroafe medicamentul se administrează intramuscular în doze:

- Pentru sincronizarea fătării şi prevenirea complicaţiilor postpartum - 0,7 ml/ per animal la 113-114 zi de gestaţie. Fătarea are loc în cele mai multe cazuri la 24-35 de ore.
- Pentru a restabili funcţia de reproducere la scroafele în călduri timp de 12 zile după înţărcarea purceilor, introduceţi 1 ml/ per animal în combinaţie cu alte medicamente gonadotrope (ser de iapă gestantă în doză de 10 unităţi (u.ş.) / 1 kg greutate corporală şi altele).
- Pentru a întrerupe o gestaţie nedorită (piometru, făt mort) se administrează 2 ml/ per animal.

8. Perioada de aşteptare

Laptele de vacă după aplicarea medicamentului poate fi utilizat în alimentaţie umană fără restricţii. Sacrificarea animalelor pentru carne este permisă nu mai devreme de 24 de ore după administrarea medicamentului. Carnea animalelor sacrificate forţat înainte de expirarea perioadei specificate poate fi folosită pentru hrănirea carnivorelor.

9. Precauţii speciale pentru depozitare

Se păstrează în ambalajul producătorului, după lista B, într-un loc uscat şi întunecat, la o temperatură de la + 5 °C până la + 25 °C.

10. Precauţii speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizat sau a deşeurilor provenite de la medicamentul de uz veterinar

Medicamentele de uz veterinar fără etichetă, cu termenul de valabilitate expirat, deteriorate sau deschise, trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele legale în vigoare.

11. Atenţionări speciale

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:

Nu sunt.

"NUTRITFARM" S.R.L. PENTRU FACTURI

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Atunci când se utilizează medicamentul este necesar să se respecte regulile generale de igienă și de siguranță la locul de muncă prevăzute cu medicamente de uz veterinar
Se va evita contactul direct cu ochii sau pielea. Pe timpul aplicării medicamentului de uz veterinar se va purta echipament de protectie.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:
Medicamentul este interzis pentru utilizare la animalele gestante (cu excepția cazurilor de întrerupere a gestației) și la animale imature.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Medicamentul de uz veterinar nu se va administra concomitent cu medicamente antiinflamatoare.

Supradozare
Nu au existat efecte secundare și complicații la utilizarea medicamentului în conformitate cu această instrucțiune.
În caz de hipersensibilitate individuală și supradozare poate apărea pe durată scurtă o creștere a frecvenței cardiace și a respirației, creșterea temperaturii corpului, creșterea defecației și urinării, salivație și vomă, care dispar spontan fără intervenție medicală.

12. Perioada de valabilitate
Perioada de valabilitate este de 2 ani de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de depozitare.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: nu se poate păstra.

13. Statutul legal
Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. Natura și compoziția ambalajului primar
Medicamentul de uz veterinar este ambalat în flacoane din sticlă cu un volum nominal 10, 50, 100, 200, 250, 400, 450 și 500 ml.

15. Data ultimei revizuiri a textului
12.2022

Distribuitor: "NUTRITFARM" SRL, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 77, Republica Moldova, office@nutritfort.md; telefon: +37379518904

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

"NUTRITFARM" S.R.L. PENTRU FACTURI