

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ferantel

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau
- Agenciei Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. Denumirea și adresa deținătorului certificatului de înregistrare și ale producătorului/fabricantului responsabil pentru eliberarea medicamentului de uz veterinar

Compania cu răspundere limitată "Belekotekhnika", per. Promyshlenniy 9, 222823, p. Svisloci, districtul Pukhovicishii, regiunea Minsk, Republica Belarus.

2. Denumirea medicamentului de uz veterinar, concentrația și forma farmaceutică ale acestuia

Ferantel (Ferantelum).

Medicamentul reprezintă o suspensie, de la culoarea galben deschis spre culoarea crem.

2.3 1 g (1 ml) de pastă pentru administrare orală conține: 25 mg praziquantel, 72 mg pirantel pamoat (pyrantel embonat), 75 mg fenbendazol, substanțe auxiliare (Vit. E, emulgatori, stabilizatori)

3. Indicații terapeutice (*pe specie țintă*)

Medicamentul este utilizat pentru deparazitarea profilactică și terapeutică a pisicilor și câinilor, are un spectru larg de acțiune nematodicidă și cestodicidă, este activ împotriva viermilor rotunzi și teniei în toate etapele de dezvoltare. Medicamentul este întrebuințat la pisici, câini, pentru scopuri profilactice și terapeutice în cazul nematodozelor (ohosaroza, toxascaridoza, uncinarioza, trichocefaloza, anchilostomoza), cestodozelor (teniidoza, dipilidioza, echinococcozelor, difilobotriozei, mezocistodozei) și infestări mixte cu cestode și nematode.

4. Contraindicații

Este contraindicat în cazul în care animalele prezintă sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului.

Nu trebuie administrat la cățeluși, pisoi, cu vârsta mai mică de 3 săptămâni.

Nu se administrează animalelor bolnave de maladii infecțioase și animalelor în perioada de recuperare.

5. Reacții adverse

În doze recomandate, nu au fost observate careva efecte adverse.

În caz de sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului și apariția reacțiilor alergice, utilizarea acestuia este întreruptă și animalului se prescrie o soluție de 0.1% de sulfat de atropină și terapie simptomatică.

6. Specii ținta

Câini și pisici.

7. Posologie pentru fiecare specie, metoda, modul de administrare

Medicamentul se administrează pe cale orală, individual, o singură dată, fără dietă prealabilă, dimineața se va hrăni cu o cantitate mică de hrană, sau se aplică forțat pe rădăcina limbii cu ajutorul unei seringi dozătoare.

Pisici și câini - 1 g (ml) de pastă la 5 kg de greutate corporală (15 mg de fenbendazol, 14,4 mg de pirantel și 5 mg de praziquantel la 1 kg).

În caz de grad puternic de invazie, este recomandată deparazitarea repetată peste 10 zile.

În scop profilactic, câinii și pisicile sunt deparazitați o dată la 3 luni în doza indicată mai sus, precum și înainte de fiecare vaccinare, cu cel puțin 3 zile.

8. Perioada de așteptare

Nu este cazul.

9. Precauții speciale pentru depozitare

Se păstrează în ambalajul producătorului din lista B, într-un loc uscat și întunecat, la o temperatură de la + 5 °C până la + 25 °C.

10. Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite de la medicamentul de uz veterinar

Medicamentul de uz veterinar veterinar fără etichetă, cu termenul de valabilitate expirat, deteriorate sau deschise, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

11. Atenționări speciale

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu se administrează animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Atunci când se utilizează medicamentul este necesar să se respecte regulile generale de igienă și de siguranță la locul de muncă prevăzute cu medicamente de uz veterinar.

Se va evita contactul direct cu ochii sau pielea.

Pe timpul aplicării medicamentului de uz veterinar se va purta echipament de protecție.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează femelelor gestante în prima jumătate a gestației.



Femelelor gestante li se prescrie medicamentul cu 3 săptămâni înainte de fătare așteptată cu precauție, sub supravegherea unui medic veterinar, femelelor care alăptează – peste 2-3 săptămâni după fătare.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Medicamentul de uz veterinar nu se va administra concomitent cu piperazina și medicamente, care inhibă colinesteraza.

Supradozare

În cazul supradozării semnificative, animalul poate manifesta o stare depresivă, refuzul de hrană, salivă excesivă și tulburări ale tractului gastrointestinal. În aceste cazuri, aplicați măsuri generale care vizează eliminarea medicamentului din organism.

12. Termenul de valabilitate

Perioada de valabilitate este 2 ani de la data fabricării, cu respectarea condițiilor de depozitare.

13. Statutul legal

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. Natura și compoziția ambalajului primar

Medicamentul de uz veterinar este ambalat în ambalaje polimerice cu un volum nominal – 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30 și 50 g

15. Data ultimei revizuirii a textului

12.2022

Distribuitoare: "NUTRITFARM" SRL, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 77, Republica Moldova, office@nutritfort.md; telefon: +37379518904

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

