

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Rafenzol

(emulsie pentru uz intern)

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Brovafarma", Ucraina, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18-a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Rafenzol

Emulsie pentru uz intern, de culoare albă sau gri-pal.

1 ml conține:

Substanța activă:

Rafoxanid – 110 mg,
Fenbendazol – 75 mg.

Excipienți:

Tiloză, tvin-80, arcuad 50 și apă purificată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pentru dehelmintizarea bovinelor și ovinelor în cazul infestărilor cu:

- trematode: *Fasciola hepatica* (forme mature și imature în perioada migrației de la 6 săptămâni și mai mult), *Dicrocoelium lanceatum*, *paramphistomum spp.*, *Liorchis scotiae*, *Gastrothylax crumenifer*;
- nematode ale tractului digestiv: *Haemonchus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Nematodirus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Ostertagia spp.*, *Chabertia ovina*, *Strongyloides spp.*, *Trichuris spp.*, *Neoscaris vitulorum*.
- Nematode ale tractului respirator: *Dictyocaulus viviparus*, *Dictyocaulus filaria*, *Muellerius capillaria*, *Protostrongylus spp.*;
- cestodelor: *Moniezia spp.*, *Avitellina centripunctata*, *Thysaniezia giardia*.

Tratamentul ovinelor în cazul infestării cu larve de *Oestrus ovis*.





4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra vacilor în gestație avansată și îndată după fătare.

Nu se administrează animalelor cu simptome clinice de dereglări funcționale ale tractului digestiv (atonie prestomacelor, timpanie).

A nu se administra concomitent cu bromsolan flukicide.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform prospectului dat, reacții adverse și complicații nu apar.

În rare cazuri bovinele în urma administrării pot manifesta anxietate, hipersalivație, poliurie.

În calitate de antidot se folosește soluție de glucoză de 40% (i/venos) și soluție de cofeină (s/cutanat).

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de administrare a se agita !

Dehelmintizarea se efectuează o singură dată, până la înfurajarea de dimineață.

Rafenzol se administrează per oral, în amestec cu apă caldă (+25°C-+30°C) sau omogenizat cu 1,5-2 kg de furaj combinat umezit în următoarele doze:

Bovine:

Nematodoze, cestodoze – 0,75 ml/10 kg masă corporală,

Trematodoze – 1 ml/10 kg masă corporală.

Ovine:

Invazii mixte și estroză – 0,75 ml/10 kg masă corporală.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carcase - 60 zile de la ultima administrare.

Este interzisă utilizarea la animale producătoare de lapte pentru consum uman.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C de la +5°C până la +25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar nefolosit se elimină conform reglementării locale, ambalajele se elimină cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Rafenzol se administrează cu atenție deosebită animalelor cu dereglări funcționale ale ficatului, rinichilor și ale sistemului cardiovascular.





Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se agita înainte de administrare!

Înainte dehelmintizărilor în masă, fiecare lot de Rafenzol se testează în prealabil pe un număr mic de animale, care se urmăresc timp de 24 ore. În lipsa complicațiilor, se administrează la tot efectivul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Rafenzol e necesar de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului li se recomandă evitarea contactului direct cu Rafenzol.

În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau mucoasele oftalmice, acestea se spală din abundență cu apă.

În caz de apariție a reacției alergice sau la ingerare, e important de adresat la o instituție medicală cât de repede posibil (a se prezenta medicului eticheta sau prospectul).

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se administra vacilor în gestație avansată și îndată după fătare.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Este contraindicată folosirea concomitentă cu bromsolan flukicide.

Supradozare:

Nu au fost cazuri înregistrate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din sticlă sau polimer a câte 50, 100, 500 și 1000 g.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

02/2023

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, mun. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

