Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

BROVAFERAN-100
Soluţie injectabilă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiţi acestmedicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru Dumneavoastră.

-Păstraţi acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
-Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
-Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
-Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
-Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO "Brovafarma", Ucraina, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
Brovaferan 100
Soluţie injectabilă de culoare brună - roşiatică.

1 ml conţine:
Substanţa activă:
Fier III-dextran (complex al hidroxidului de fier cu dextran) - 100 mg

Excipienţi:
Apă pentru injecţii.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE
Profilaxia şi tratamentul anemiei feriprive la animale domestice, în deosebi la purcei şi viţei.

4. CONTRAINDICAŢII
A nu se administra animalelor cu deficienţă de vitamina E şi Seleniu.

5. REACŢII ADVERSE
Nu sunt date înregistrate.
Dacă observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

6. SPECII ŢINTĂ
Porcine (scroafe, purcei), bovine (viţei), ovine (miei) , nurci.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Se administrează prin injecţie intramusculară profundă în zona coapsei sau gâtului.
Înainte de administrare flaconul se încălzeşte la baia de apă până la temperatura corpului.

În scop preventiv (o singură administrare la 1 animal):
Purcei 3-4 zile - 1,5-2 ml
Viţei 5-6 zile - 8-10 ml
Miei 3-5 zile - 2-3 ml
Nurci - 0,3 - 0,5 ml.
Scroafe (cu 3-4 săptămîni înainte de fătare) - 10 ml.

Dacă în gospodărie se înregistrează animale cu simptome de anemie, în scop curativ se administrează de 2-3 ori, în aceleaşi doze, la interval de 7 zile.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Carne şi organe- 0 zile.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare şi furaje, la T^0C $+3^0C$ - $+25^0C$, în locuri inaccesibile copiilor. A se feri de îngheţ!
A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar nefolosit se elimină conform reglementării locale, ambalajele se elimină cu deşeurile menajere.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Nu sunt.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
La locul injectării poate apărea un edem uşor, care dispare după câteva zile.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul lucrului cu Brovaferan- 100 e necesar de respectat regulile comune de igienă personală şi a tehnicii securităţii prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.
Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului li se recomandă evitarea contactului direct cu Brovaferan- 100. În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundenţă cu apă.
În caz de apariţie a reacţiei alergice sau la îngerare, e important de adresat la o instituţie medicală cît de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul).
În timpul lucrului se interzice fumatul,consumul de alimente şi băuturi.
La finisarea lucrului mânile se spală cu apă şi săpun.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:
Fără restricţii.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Antiacidele încetinesc absorbţia fierului.
Administrarea concomitentă cu acidul acetohidroxamic scade eficacitatea ambelor medicamente; cu medicamentele care conţin fier - este posibilă depozitarea ionilor de Fier+ în ficat.
Administrarea concomitent cu tetraciclinele - scade eficienţa lor, administrarea este posibilă la interval de 2-3 ore.
În combinaţie cu tocoferolul - scade eficienţa la ambele medicamente.
Administrarea cu colestiramina – scade eficienţa medicamentelor care conţin fier, cu acidul etidronic - scade eficienţa acidului (administrarea este posibilă la interval de 2 ore).

Supradozare:
Supradozarea poate provoca sideroză, intoxicare asociată cu hipotonie, şoc şi moarte.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
Perioada de valabilitate - 3 ani din data producerii,
Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului – 24 ore.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează cu prescripţie veterinară.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR
Flacon din sticlă a cîte 10, 20, 50, 100 şi 200 ml.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI
02.2023

16. DENUMIREA ŞI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA
SRL" Zoofarmagro", m.Chişinău, str.Cameniţa 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR