

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ANALGIN 50% soluție injectabilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
 - Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
 - Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
 - Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.
- Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina. tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

ANALGIN 50%

Soluție injectabilă, transparentă, incoloră pînă la galbenă.

1 ml de medicament conține (mg):

Substanța activă:

Metamizol de sodiu - 500;

Excipienți:

Metabisulfid de sodiu;

Apă pentru preparate injectabile - pînă la 1 ml.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Tratamentul cîinilor cu afecțiuni ale mușchilor și articulațiilor, pentru reducerea durerilor de diverse origini, în special în afecțiunile tractului digestiv, ca tratament simptomatic în stări de febră. Medicamentul este utilizat în procesul de extracție a obiectelor străine din faringe și esofag la cîini.

4. CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate față de metamizol de sodiu.

A nu se utiliza la pisici, precum și la animalele cu insuficiență renală, astm bronșic, tulburări ale sistemului hematopoietic.

Nu se injectează subcutanat.

5. REACȚII ADVERSE

Nu au fost observate reacții adverse la dozele recomandate.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se administrează intravenos (lent) în doza 0,4-1 ml la 10 kg masă corporală (corespunzător 20-50 mg metamizol de sodiu la 1 kg masă corporală).

Dacă este necesară anestezie rapidă, medicamentul este recomandat să fie administrat la animale lent pe cale intravenoasă.

Pentru a prelungi acțiunea, medicamentul se administrează intramuscular. După finisarea acțiunii medicamentului, administrarea se repetă conform indicațiilor.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Loc uscat și întunecat inaccesibil copiilor la temperaturi de la +5°C până la +25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Cînd lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci cînd lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiuni:

Fenobarbitalul, alte barbiturice și glutetimida accelerează excreția metamizolului.

Utilizarea simultană cu clorpromazină poate determina creșterea hipotermiei.

Supradozare

Nu a fost observată.



12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate: 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar este de 28 de zile, cu condiția că se va păstra la temperaturi de la +5°C până la +25°C.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane de sticlă, închise cu dopuri de cauciuc și cu capac din aluminiu, a câte 10 și 50 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

03.2023

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

