



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

AMOCLOX DC

suspensie pentru administrare intracisternală

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „O .L.KAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina, tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

AMOCLOX DC suspensie pentru administrare intracisternală

O seringă (4,5g) conține (mg):

Substanțe active:

Cloxacilină benzatin - 600;

Ampicilină trihidrat - 300.

Excipienți:

Stearat de calciu, vaselină - până la 10 g.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul mastitei la vaci în perioada de repaus mamar.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra la vacile care alăptează.

A nu se administra la vacile care sunt în perioada scurtă de repaus mamar.

A nu se administra mai târziu de 49 de zile înainte de fătare.

A nu se administra animalelor sensibile la peniciline.

5. REACȚII ADVERSE

Nu au fost identificate.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vacii).



7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

După ultima mulsoare, conținutul unei seringi este administrat în fiecare sfert al glandei mamare, care este în prealabil muls și dezinfectat.

După administrarea medicamentului în sferturile glandei mamare, este masat ugerul pentru a se distribui medicamentul uniform.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Laptele destinat consumului uman poate fi folosit după 96 de ore de la fătare. Dacă fătarea a trecut după 49 de zile de la ultimul tratament, laptele pentru consum uman poate fi folosit după 49 de zile + 96 de ore de la ultima administrare a medicamentului. Este interzisă sacrificarea animalelor pentru carne în timpul tratamentului. Utilizarea cărnii pentru consum uman este permis după 28 de zile de la ultima administrare a medicamentului.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat, întunecat, la o temperatură de la 15 °C până la 25° C.

A nu se păstra împreună cu alimente, băuturi și hrana animalelor.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Folosirea medicamentului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă aceasta nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informațiile epidemiologice locale cu privire la sensibilitatea speciilor bacteriene țintă.

Trebuie luate în considerare politicile oficiale antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează medicamentul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

La manipularea medicamentului de uz veterinar este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație și lactație:

A nu se administra la vacile care alăptează.

A nu se utiliza mai târziu de 49 de zile înainte de fătare.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt cunoscute.





Supradozare:

Nu au fost identificate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Seringi intramamare de 4,5 g, ambalate a câte 4 buc. într-o pungă de polimer.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

03.2023

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

