

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

AMOCLOX DC suspensie pentru administrare intracisternală

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

O seringă (4,5g) conține (mg):

Substanțe active:

Cloxacilină benzatin - 600;

Ampicilină trihidrat - 300.

Excipienți:

Stearat de calciu, vaselină - până la 10 g.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie pentru administrare intracisternală.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Bovine (vacii).

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Tratamentul mastitei la vacii în perioada de repaus mamar.

4.3 Contraindicații:

A nu se administra la vacile care alăptează.

A nu se administra la vacile care sunt în perioada scurtă de repaus mamar.

A nu se administra mai târziu de 49 de zile înainte de fătare.

A nu se administra animalelor sensibile la peniciline.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Folosirea medicamentului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă aceasta nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informațiile epidemiologice locale cu privire la sensibilitatea speciilor bacteriene țintă.

Trebuie luate în considerare politicile oficiale antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează medicamentul.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

La manipularea medicamentului de uz veterinar este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

4.6 Reacții adverse:

Nu au fost identificate.





4.7 Utilizare în perioada de gestație și lactație:

A nu se administra la vacile care alăptează.

A nu se utiliza mai târziu de 49 de zile înainte de fătare.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt cunoscute.

4.9 Doză și calea de administrare

După ultima mulsoare, conținutul unei seringi este administrat în fiecare sfert al glandei mamare, care este în prealabil muls și dezinfectat.

După administrarea medicamentului în sferturile glandei mamare, este masat ugerul pentru a se distribui medicamentul uniform.

4.10 Supradozare:

Nu au fost identificate.

4.11 Perioada de așteptare:

Laptele destinat consumului uman poate fi folosit după 96 de ore de la fătare. Dacă fătarea a trecut după 49 de zile de la ultimul tratament, laptele pentru consum uman poate fi folosit după 49 de zile + 96 de ore de la ultima administrare a medicamentului. Este interzisă sacrificarea animalelor pentru carne în timpul tratamentului. Utilizarea cărnii pentru consum uman este permis după 28 de zile de la ultima administrare a medicamentului.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: combinații de peniciline pentru administrare intracisternală.

Codul ATC vet: QJ5ICR50.

5.1.2 Mecanism de acțiune:

Mecanismul de acțiune al antibioticelor este de a perturba sinteza peretelui celular bacterian, provocând dezechilibru osmotic în bacterii și moartea acestora.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

AMOCLOX DC este un medicament antimicrobian combinat, care include cloxacilină benzatină și ampicilină trihidrat, activ împotriva majorității tulpinilor de bacterii gram-pozitive și gram-negative (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Neisseria spp.*).

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică

AMOCLOX DC este recomandat pentru tratamentul la vacile aflate în perioada de repaus mamar, posedă acțiune bactericidă rapidă. Este activ față de stafilococi penicilino-rezistenți, care reprezintă o cauză a mastitelor. Sarea benzatinică cu acțiune prelungită menține niveluri antibacteriene eficiente. Medicamentul asigură protecție antibacteriană a ugerului pe o perioadă de până la 10 săptămâni.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Concentrațiile inhibitorii minime de ampicilină și cloxacilină în lapte rămân la niveluri înalte și active față de germeni, obiectiv atins de durata tratamentului.





6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

stearat de calciu, vaselină - până la 10 g.

6.2 Incompatibilități

Nu sunt cunoscute.

6.3 Perioada de valabilitate:

24 luni.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra la loc uscat, întunecat, la o temperatură de la 15 °C până la 25° C.

A nu se păstra împreună cu alimente, băuturi și hrana animalelor.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Seringi intramamare de 4,5 g, ambalate a câte 4 buc. într-o pungă de polimer.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500,

tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87

e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

230024

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

22.03.2023

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

03.2023

