Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT

BOROGLUCONAT DE CALCIU 20%
soluţie injectabilă

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Numele şi adresa: „Medicamentum" SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi
telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39
e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

BOROGLUCONAT DE CALCIU 20%
Soluţie injectabilă pentru: cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini.

3. DECLARAŢIA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENŢI

Fiecare ml conţine:
Substanţa activă:
Gluconat de calciu – 200 mg
Acid boric – 18,5 mg
Tetraborat de sodiu – 13 mg

Excipienţi:
Apă purificată

4. INDICAŢII TERAPEUTICE *(pe specii ţintă)*

Indicat în tratamentul următoarelor afecţiuni: pareze şi paraplegii (ante şi postpartum), hipocalcemii, tetanii, tulburări metabolice, intoxicaţii, alergii, toxicoze, rahitism, osteomalacie, stări hemoragice, anemii, ateropatii, după accidente post-vaccinale, distocii, avorturi, prolaps vaginal şi uterin, operaţii cezariene, enteropatii, animalele slăbite, tahicardice sau cu aritmii cardiace, în tulburări ale spermatogenezei la cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini.

5. CONTRAINDICAŢII

Se recomanda să nu se administreze calciu la animalele tratate cu digoxine.

6. REACŢII ADVERSE

Dozele prescrise nu dau reacţii adverse.

7. SPECII ŢINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se va administra în perfuzii intravenoase lente. Pe cât posibil a se administra la temperatura corporală şi în următoarele doze:
Bovine 250 – 300 ml;
Cabaline – 150 – 250 ml;
Caprine şi ovine – 50 – 100 ml;
Suine – 30 – 100 ml;
Câini – 5 – 25 ml.
Dozele se repetă zilnic sau o dată la 2 – 3 zile.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se vor respecta dozele recomandate.

10. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Zero zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se pastra la temperatura +18 - + 20°C.
A se proteja de lumina directă.
A se păstra în ambalajul original.
A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.
Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.
Perioada de valabilitate de la prima deschidere – 10 zile.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE.
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Administrarea medicamentului de uz veterinar pe cale intravenoasă se face lent, numai după ce este adus la temperatura corpului. Injectarea intravenoasă se întrerupe imediat dacă apar vărsături, sudoraţii sau tremurături musculare.
Locurile de injectare subcutanată trebuie masate cu blândeţe.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Trebuie avută grijă pentru a evita auto-injectarea accidentală.
În cazul unei injectări accidentale solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul sau eticheta la medic.

Utilizare in perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Gluconatul de calciu nu se administreaza împreuna cu digoxina, antacide care conţin calciu sau aluminiu, alte suplimente cu calciu, calcitriol sau suplimente cu vitamina D, antibiotice ca tetraciclina, doxiciclina, minociclina sau oxitetraciclina.
Gluconatul de calciu este incompatibil în soluţie cu: emulsiile uleioase intravenoase, cu Amfotericina B, cefamendol naftat, cafalotin sodium, dobutamina clorhidrat, metilprednisolol succinat de sodiu si metoclopramid clorhidrat.

Supradozare:
Simptomele supradozării cu calciu includ: greaţă, vomă, pierderea apetitului, constipaţie, confuzie, stare de prostaţie, comă.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
29.05.2023

15. ALTE INFORMAŢII
Natura şi compoziţia ambalajului primar:
Flacon de sticlă brună cu volumul de 100 ml.

Se eliberează numai pe bază de prescripţie veterinară.

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.