Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT

TES-NORMIN
suspensie injectabilă

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Numele şi adresa: „Medicamentum" SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi
telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39
e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

TES-NORMIN
Suspensie injectabilă, complex de ţesuturi emulsionate pentru: cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

3. DECLARAŢIA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENŢI

Fiecare 100 ml suspensie injectabilă conţine:
Substanţa activă:
Ţesuturi emulsionate (testicule de bovine) – 50,0 g
Clorură de sodiu – 0,9 g

Excipienţi:
Cloramina – 2,0 g
Apă purificată până la – 100 ml

4. INDICAŢII TERAPEUTICE

Medicamentul de uz veterinar TES-NORMIN suspensie injectabilă este indicat pentru tratarea femelelor cu afecţiuni reproductive (retenţia învelitorilor fetale, metrite cronice şi acute, vaginite, mastite, hipofuncţiile ovarelor).
La fel este indicat în tratarea masculilor în caz de incapacitate şi activitate reproductivă redusă. Medicamentul de uz veterinar sporeşte nivelul imun nespecific şi acţionează ca cicatrizant, poate fi utilizat în inflamaţii ale orgalelor aparatului gastro-intestinal, respirator.
TES-NORMIN-ul este eficient în dermatite şi papilomatoze, are capacităţi de regenerare a troficii nervoase a ţesuturilor după traume şi a ciumei nervoase la câini.

5. CONTRAINDICAŢII

TES-NORMIN-ul nu se administrează în caz de maladii ale ficatului şi rinichilor.

6. REACŢII ADVERSE

Nu sunt.

7. SPECII ŢINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

TES-NORMIN suspensie injectabilă se administrează subcutanat.
În prealabil se încălzeşte până la temperatura +35°C şi se agită energic; înainte de administrare se diluiază cu soluţie Novocaină 0,5% în raport de 1:1, doza în dependenţă de specie:

Specia de animale	Greutatea corporală (kg)	Doze (ml)
Cabaline	400-500	2-3
Bovine	450-500	6-7
Tineret bovin:	80-100	3
	până la 80	1-2

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun.Chișinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Ovine, caprine		0,5-1
Suine		0,5-1
Tineret suin		0,2
Câini		0,1-1
Pisici		0,1

Repetare la 7-10 zile, durata tratamentului 3-5 administrări.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Pentru a asigura doza corespunzătoare greutatea corporală a animalelor trebuie calculată cât mai exact pentru a evita subdozarea medicamentului.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE
Zero zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatura +4 - +10°C, condiții de frigider, ferit de lumină.
A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.
Perioada de valabilitate 24 luni în ambalaj original.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE
Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:
Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Trebuie urmate tehnicile uzuale pentru injectarea aseptică.
A se încălzi produsul înainte de administrare până la temperatura +35°C şi a se agita energic!

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Trebuie de avut grijă pentru a evita auto-injectarea accidentală, mai ales în cazul persoanelor cu hipersensibilitate. În cazul unei injectări accidentale solicitați imediat sfatul medicului şi prezentați prospectul sau eticheta la medic. Spălați-vă pe mâini după folosire.

Utilizare in perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:
Nu este cazul.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacțiune:
Nu este cazul.

Supradozare:
Depăşirea dozei de până la 20 ori nu determină reacții adverse.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
29.05.2023

15. ALTE INFORMAȚII
Natura şi compoziția ambalajului primar:
Flacon de sticlă brună cu volumul de 50 ml ambalat individual în cutie de carton.
Se eliberează cu prescripție veterinară.

MEDICAMENTUM S.R.L.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

