

PROSPECT

**MEDIGAL – T
comprimate**

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Numele și adresa: „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,

s. Merenii Noi

telefon: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

MEDIGAL-T, comprimate pentru: pui de găină și curcă, găini și curci, fazani.

3. DECLARAȚIA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI

1 comprimat MEDIGAL - T conține:

Substanța activă:

Tilozină tartrat – 12 mg

Sulfametoxazol – 18 mg

Excipienți:

Amidon de porumb – 11 mg

Stearat de magneziu

Lactoza

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Indicat pentru tratamentul infecțiilor bacteriene primare și secundare, determinate de germeni sensibili la acțiunea tilozinei și a sulfametoxazolului la găini, curci, pui de găină, pui de curcă și fazani în tratamentul coccidiozei la speciile țintă.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consumul uman.

6. REACȚII ADVERSE

Sulfamidele sunt puțin toxice, eventuale efecte adverse ca urmare a administrării sulfametoxazolului fiind bine suportate.

7. SPECII ȚINTĂ

Pui de găină, pui de curcă, găini, curci, fazani.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Medicamentul de uz veterinar se poate administra pe cale orală, individual, ca atare sau prin intermediul furajelor combinate sau concentrate în care a fost încorporat produsul după o mărunțire.

Pui de găină și curcă – 1 comp./zi, timp de 3 – 5 zile;

Găini și curci – 2 comp./zi, timp de 3 – 5 zile;

Fazani – 1 comp./zi, (indiferent de vârstă) timp de 3 – 5 zile.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu există.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe – 5 zile.



11. PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 18 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu există.

Precauții speciale de utilizare la animale:

Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării medicamentului de uz veterinar, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea medicamentului de uz veterinar în afara prospectului de utilizare poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la antibiotice și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată.

La utilizarea medicamentului de uz veterinar vor fi luate în considerație politicile oficiale și locale privind medicamentele de uz veterinar – antimicrobiene.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În caz de ingestie accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul de utilizare a medicamentului de uz veterinar. Persoana care manipulează medicamentul de uz veterinar trebuie să poarte echipament de protecție.

După administrare se recomandă spălarea mâinilor.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează la păsările care produc ouă pentru consumul uman.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Sulfamidele sunt antagoniste cu substanțele care prin hidroliză eliberează acid paraaminobenzoic (derivații anilinei, anestezină, procaină), cu acidul folic, vitamina PP, drojdia de bere (factori ai creșterii bacteriene), metionina, peptona, acidul boric.

Supradozare:

În general sulfamidele sunt puțin toxice. Dozele mortale minimale ajung la 0,2 – 0,4% din greutatea corporală. Dar pot apărea și cazuri de intoxicații atunci când se depășesc dozele terapeutice și tratamentul este îndelungat.


Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar nu trebuie aruncat în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea lor, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Animalele tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și nu se vor utiliza în fertilizarea solului.



14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
29.05.2023



15. ALTE INFORMAȚII

Natura și compoziția ambalajului primar:

Borcănaș de polietilenă de înaltă densitate cu 100 comprimate.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

