Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT

NIFULIN MOF
pulbere pentru administrare orală

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE
Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service"
str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Şargorod, reg. Vinița, 3500, Ucraina
tel./fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27
e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
NIFULIN MOF pulbere pentru administrare orală

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)
1g de medicament conține (mg):
Substanţa activă:
Metronidazol - 110;
Clorhidrat de oxitetraciclină - 25;
Furazolidonă - 65.

Excipienţi: amidon de porumb, carbonat de calciu.

4. INDICAŢII TERAPEUTICE
Câini, pisici: tratamentul animalelor cu boli ale tractului digestiv şi prevenirea complicaţiilor chirurgicale cauzate de microorganisme sensibile la componentele medicamentului.
Animale de blană (nurcă, vulpe arctică): tratamentul animalelor cu eimerioză (coccidioză), precum şi cu boli ale tractului digestiv cauzate de microorganisme sensibile la componentele medicamentului.
Porumbei decorativi: tratamentul păsărilor cu histomonoză, eimerioză (coccidioză), salmoneloză, trichomonoză cauzată de microorganisme sensibile la componentele medicamentului.

5. CONTRAINDICAŢII
A nu se utiliza la animale cu hipersensibilitate individuală la componentele medicamentului, precum şi în boli ale ficatului şi rinichilor.
A nu se administra animalelor productive.
A nu se utiliza la animale cu afectiuni ale sistemului nervos central, la fel şi la femelele gestante şi în lactaţie.
A nu se utiliza la căţeluşi şi pisoi.

6. REACŢII ADVERSE
În cazul de utilizare prelungită, pot apărea reacţii alergice, vomă, diaree, tulburări ale sistemului nervos, letargie, slăbiciune, modificări ale componentei celulelor sanguine.

7. SPECII ŢINTĂ
Câini, pisici, animale de blană (nurcă, vulpe arctică), porumbei decorativi.

CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI
PENTRU DOCUMENTE
«FARMAVET»
S.A.
IDNO 1002600023741

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează oral cu hrana în doze:
Câini, pisici - 0,1-0,2 g de medicament la 1 kg de masă corporală, de 3 ori pe zi, timp de 7-10 zile;
Animale de blană (nurcă, vulpe arctică) - 0,2-0,3 g de medicament la 1 kg de masă corporală, de 3 ori pe zi, timp de 3-5 zile;
Porumbei decorativi - 3 g de medicament la 1 kg de furaj pe zi, timp de 7-10 zile.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu utilizați Nifulin Mof daca observați semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar.

10. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Loc uscat şi întunecat, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la + 2 °C până la + 20 °C.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:
Cursul de tratament se repetă după o pauză de 10 zile.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Utilizați cu precauție la animalele cu insuficiență renală și hepatică.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Când lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală şi măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:
A nu se utiliza la femele în timpul perioadei de gestaţie şi alăptării.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Medicamentul este incompatibil cu buspirona, fenilpropanolamina, efedrina, antidepresivele triciclice, nitrofuranele.

Supradozare:
Componentele medicamentului sunt compuşi cu toxicitate scăzută, deci o supradoză este improbabilă.
În cazul utilizării prelungite, ar putea fi observate tulburări ale sistemului hematopoietic şi rinichi. Supradozajul poate provoca tulburări gastro-intestinale (vomă, anorexie, diaree). Dacă există semne de supradozaj, se încetează imediat administrarea medicamentului şi se prescrie medicamente alcaline şi diuretice.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
05.2023

15. ALTE INFORMAŢII
Pachete cu folie polimerică şi/sau folie laminată a câte 20 g şi 100 g.

Se eliberează numai pe bază de prescripţie veterinară.

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.

REPUBLICA MOLDOVA mun. CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI
PENTRU DOCUMENTE
«FARMAVET»
S.A.
IDNO 1002600023747