



PROSPECT

LEVAMISOL 75

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

OOO "NITA-FARM", 410010, or. Saratov, str. Osipova V.I. 1

Tel./fax: +7(4852)338-600

e-mail: client@nita-farm.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Levamisol 75, soluție injectabilă.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml conține:

Substanța activă:

Levamisol hidroclohid (recalculate la levamisol de bază) – 75 mg

Excipienți: bisulfit de sodiu, cloreton, acid citric, 1,2-propandiol, EDTA, hidroxid de sodiu, apă pentru injecții.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Levamisol 75 se folosește pentru dehelmintizarea:

- **bovinelor și ovinelor** în caz de dictiocauloză, hemonhoză, bunostomoză, esofagostomoză, nematodiroză, ostertagioză, habertioză, cooperioză și strongiloidoză;
- **porcinelor** în ascaridoză, esofagostomoză, strongiloidoză, tricocefaloză, hiostrongiloză și metastrongiloză;

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra Levamisol 75 în cazul sensibilității individuale sporite la componentele medicamentului și animalelor slăbite, istovite sau bolnave de boli infecțioase.

6. REACȚII ADVERSE

În urma administrării medicamentului Levamisol 75 conform instrucțiunii date, reacții adverse și complicații nu apar. În caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la excipienții ale medicamentului și apariție a reacțiilor alergice, administrarea se stopează și se recurge la terapie simptomatică și antihistaminice.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, porcine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrarea medicamentului nu necesită dietă de foame în prealabil și nici folosirea laxativelor

Se administrează 1 dată, s/cutanat sau i/muscular, în doză de 7,5 mg substanță activă/1 kg greutate corporală, ceea ce corespunde: 1 ml de Levamisol 75/10 kg greutate corporală.



Doza maximală administrată să nu depășească:

- bovine – 30 ml;
- porcine – 20 ml;
- ovine – 4,5 ml.

Volumul maximal de medicament injectat într-un singur punct nu trebuie să depășească pentru bovine – 20 ml, porcine – 10 ml, ovine și viței – 5 ml.

Înainte de tratamente în masă, fiecare serie de Levamisol este testată preliminar pe un grup mic de animale (5-10 capete), care este monitorizat timp de 3 zile. În absența complicațiilor, medicamentul este utilizat pentru întregul efectiv.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Medicamentul se administrează o singură dată.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea animalelor pentru consum uman se permite peste 7 zile de la ultima administrare.

În caz de sacrificare înainte de expirarea termenului limită, carcasele pot fi folosite în hrana animalelor de blană.

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte sau ouă destinate consumului uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la $T^{\circ}\text{C}$ de la $+5^{\circ}\text{C}$ până la $+25^{\circ}\text{C}$.

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Utilizarea la animale tinere se efectuează cu precauție, sub supravegherea unui medic veterinar.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Levamisol 75, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar. Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu Levamisol 75. Se interzice fumatul și consumul de alimente sau băuturi. La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun. În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Este contraindicat vacilor gestante în ultimul trimestru, oilor, scroafelor în al doilea semestru a gestației. A nu se utiliza la animalele care alăptează.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se administra concomitent sau timp de 10 zile până la și după utilizarea medicamentelor fosfororganice, a pirantelului, morantelului și levomicetinei. Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu etanolul.

**Supradozare:**

În caz de supradozare poate apărea vomă colici, diaree, salivă, greață, vomă (la porci), reacții alergice (prurit, urticarie). Simptomele apărute de regulă dispar de la sine.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar neutilizat se elimină conform reglementării locale, ambalajele se elimină cu deșeurile menajere.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
05.2023**15. ALTE INFORMAȚII**

Flacon din sticlă a câte 20, 50 și 100 ml, cu dop din cauciuc și capac securizat din aluminiu.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare:

SRL "Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Camenița 4a

Tel./fax: +373 022 855-071; tel.: +373 022 855-073;

zoofarmagro@mail.ru

