Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT

Tetrahidrovit

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

OOO "NITA-FARM", 410010, or. Saratov, str. Osipova V.I. 1
Tel./fax: +7 (4852) 338-600
e-mail: client@nita-farm.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Tetrahidrovit
Soluţie injectabilă, opalescentă, de culoare de la galben deschis până la galben.

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

1 ml de Tetrahidrovit conţine:
Substanţa activă:
Retinol palmitat (vitamina A) – 25000 UI,
Colicalciferol (vitamina D3) – 5000 UI;
Tocoferol acetat (Vitamina E) – 25 mg;
Acid ascorbic (vitamina C) – 50 mg

Excipienţi:
Butilhidroxitoluol, alcool benzilic, metabisulfit de sodium, ulei de ricin polioxietilat-35 (cremofor EL), hidroxid de sodiu, trilon B, apă pentru injecţii.

4. INDICAŢII TERAPEUTICE *(pe specii ţintă)*

Tetrahidrovit-ul se utilizează în profilaxia şi tratamentul hipovitaminozelor la animale. Medicamentul se administrează în situaţii de stres, reducerea productivităţii şi în caz de eforturi fizice sporite: în timpul gestaţiei (doar în semestrul II) şi lactaţiei, în tulburări de reproducere; în timpul regrupărilor; în caz de modificare a raţiei la îngrăşare; în spor zilnic insuficient; în caz de boli infecţioase şi parazitare; în timpul efectuării măsurilor veterinare (vaccinări, dehelmintizări), în perioada de convalescenţă după intervenţii chirurgicale sau traume, în scăderea producţiei de ouă şi pentru întărirea cojii oului.

5. CONTRAINDICAŢII

Hipervitaminoza şi hipersensibilitatea la componentele medicamentului.

6. REACŢII ADVERSE

La administrare conform instrucţiunii date, reacţii adverse şi complicaţii nu apar.
Animalele cu sensibilitate sporită pot manifesta excitare, salivaţie abundentă, defecaţie şi urinare frecventă. În astfel de cazuri administrarea medicamentului se stopează şi se recurge la antihistaminice, terapie simptomatică şi dezintoxicare.

7. SPECII ŢINTĂ

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini şi pisici, animale de blană, iepuri, tineret aviar, curci, găini ouătoare.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Cu scop profilactic, Tetrahidrovit-ul, se administrează animalelor intramuscular sau subcutan, păsărilor – intern, în apa de băut sau furaj, 1 dată în 2-3 săptămâni.
Cu scop curativ, doza se mărește de 2-3 ori. La administrarea în apa de băut, medicamentul se adaogă în apă şi nu invers şi se omogenizează bine. Diluţia medicamentului se efectuează treptat în vas curat, evitând interacţiunea lui cu oxidanţi sau substanţe dezinfectante.
În caz de administrare cu furajul, în prealabil se diluează într-o cantitate nu prea mare de apă (1-10 litri în dependenţă de cantitatea de furaj), cu soluţia primită se umectează bine furajul şi se omogenizează minuţios.

Dozele profilactice recomandate:

Specia şi vârsta animalului	Mod de administrare
	intramuscular sau subcutan, ml/10kg greutate corp
Bovine, cabaline	0,2 - 0,25
Viţei, mânji	0,2 - 0,5
Ovine, caprine	0,5 - 0,8
Miei	1,5 - 2,0
Porcine: scroafe	0,3 - 0,45
porci la îngrăşat	0,2 - 0,3
purcei	0,4 - 1,0
Câini, pisici	0,2 - 0,3
Iepuri, animale de blană	0,6 - 1,0
Păsări domestice:	intern, ml/1 litru apă
Pui	1,5
Tineret, găini ouătoare	2,0
Curci	3,0

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Concomitent cu indicarea medicamentului Tetrahidrovit, este necesar să se echilibreze raţia pentru proteine, calciu, fosfor, magneziu, microelemente.

10. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Zero zile.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare şi furaje, la T ^{0}C de la +4 ^{0}C până la +25 ^{0}C, în locuri inaccesibile copiilor.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Nu sunt.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Particularităţi deosebite în acţiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

ZOO Farm Agro

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Se recomandă respectarea termenilor recomandaţi a administrărilor pentru a nu diminua eficienţa terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reia în aceeaşi doză conform aceeaşi scheme. Nu se utilizează dozaj dublu în locul celui omis.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul lucrului cu Tetrahidrovit, e important de respectat regulile comune de igienă personală şi a tehnicii securităţii prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.
Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu Tetrahidrovit.
Se interzice fumatul şi consumul de alimente sau băuturi. La finisarea lucrului mîinile se spală cu apă şi săpun.
În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundenţă cu apă. În caz de ingerare sau apariţie a reacţiilor alergice e necesar de adresat la o instituţie medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul).

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:
Medicamentul poate fi utilizat sub supravegherea medicului veterinar în perioada de gestaţie doar în al doilea simestru al gestaţiei şi în perioada de lactaţie.
Scroafelor gestante, medicamentul se administrează cu 3-4 săptămâni înainte de fătare, vacilor, cu 1-1,5 luni.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Tetrahidrovit nu se administrează concomitent cu hormonii corticosteroizi – deoarece ei sporesc eliminarea vitaminei D_3 din organism, dereglează asimilarea şi metabolismul de calciu.
Administrarea concomitentă a Tetrahidrovit-ului cu glicozidele cardiace, poate spori efectul toxic (sporesc riscul aritmiei). Administrarea concomitentă cu tetraciclinele sporesc riscul apariţiei hipertensiunii intracraniene.
Cu precauţie se folosesc concomitent cu AINS (Antiinflamatoarele nesteroidiene), deoarece sporesc acţiunea acestor medicamente.
Este necesar de a evita interacţiunea medicamentului cu dezinfectanţi şi oxidanţi.

Supradozare:
În caz de supradozare semnificativă, animalul poate manifesta ataxie, salivaţie abundentă, depresie.
La apariţia simptoamelor supradozării se administrează tratament simptomatic îndreptat spre eliminarea medicamentului din organism.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deşarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deşeurile menajere.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

05.2023

15. ALTE INFORMAŢII

Flacon din sticlă a câte 20, 50 şi 100 ml cu dop din cauciuc şi capac securizat din aluminiu.

Se eliberează fără o prescripţie veterinară.

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.

PENTRU FACTURI
ZOO Farm Agro