



PROSPECT

Spray insecto-acaricid Burdi fipro

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina, tel./fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Spray insecto-acaricid Burdi fipro

Spray pentru uz extern.

Lichid uleios, limpede, de culoare galben – deschis până la galben cu un miros specific.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml de medicament conține:

Substanța activă:

Fipronil - 3,0 mg.

Excipienți:

Alcool izopropilic, glicerină, ulei de ricină, acid citric, aromatizator, apă distilată.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Prevenirea și tratamentul ectoparaziților la câini și pisici: purici (*Ctenocephalus spp.*), Păduchi (*Linognathus setosus*), malofage în stadiile de dezvoltare imaginală și larvară (*Trichodectes spp.*), și acarienii scabiei (*Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*, *Rhipicephalus spp.*), acarieni acariformi (*Sarcoptidae*, *Psoroptidae*).

Medicamentul este eficient în scabia auriculară a carnivorelor - otodectoză (*Otodectes cynotis*).

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la animale bolnave sau istovite!

A nu se administra la căței și pisoi sub vârsta de 10 săptămâni, câini cu greutatea corporală sub 1 kg!

A nu se utiliza la animale sensibile la componentele medicamentului.

A nu se utiliza la femele în timpul perioadei de gestație și alăptare.

6. REACȚII ADVERSE

La locul de aplicare a medicamentului, poate apărea iritație locală, care trece rapid.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Medicamentul se aplică extern. Înainte de a trata animalul, se agită bine flaconul cu spray, se direcționează jetul de medicament pe corpul animalului de la o distanță de 10-15 cm. Medicamentul se administrează pe toată suprafața corpului în raport de 2-5 ml la 1 kg greutate corporală, se pulverizează apăsând pe pompă de 5 ori - 0,5 ml.



Când se pulverizează, flaconul cu medicamentul se menține în poziție verticală.

Se aplică medicamentul împotriva blăni; animalele cu păr lung, înainte de tratament, se piaptână cu o perie și medicamentul se aplică contra firelor de păr, astfel, încât să ajungă pe piele.

În cazul infestării cu scabie, păduchi, malofagoză, tratamentul se efectuează de 2-3 ori cu un interval de 10-12 zile. Tratamentul animalelor se efectuează în timpul activității sezoniere a paraziților, dar și în cazuri de necesitate.

Pentru a preveni infestarea animalelor cu ectoparaziți, este necesar să schimbați periodic așternutul sau să-l pulverizați, inclusiv și articolele de îngrijire a animalelor, în doză de 2 ml de spray pe 1 m².

În tratamentul otodectozei (scabia auriculară), canalul auditiv inițial se curăță de ceară, exsudat și cruste, ulterior se administrează a câte 0,5 ml de medicament în fiecare ureche.

Pentru a distribui uniform medicamentul, închideți canalul auricular și masați ușor, fixând capul animalului timp de 5-10 minute pentru a preveni eliminarea medicamentului.

Medicamentul este administrat în ambele urechi, chiar dacă este afectată o singură ureche.

Împotriva căpușelor *Ixodidae* de pe corpul animalelor, medicamentul trebuie aplicat în doză de 0,5 ml direct pe căpușă și pe locul atașării acesteia pe piele. Dacă căpușa nu cade singură în 30 de minute, trebuie îndepărtată cu grijă cu o pensetă și distrusă.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu utilizați Burdi fipro dacă observați semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

La loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la +2 °C până la +25 °C.

A nu se păstra împreună cu alimente, băuturi sau hrana animalelor.

Perioada de valabilitate: 12 luni.

A nu se utiliza după data expirării-marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Tratamentul animalelor cu medicamentul trebuie efectuat în aer liber sau în încăperi bine ventilate, păstrând animalele până când blana este complet uscată.

Se interzice aplicarea sprayului pe mucoase.

Este interzisă îmbăierea și atingerea animalelor în decurs de 48 de ore după tratament.

Se evită linsul de către animal a medicamentului de pe piele după tratament.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Când lucrați cu medicamentul, este interzis să fumați, să beți, să mâncați.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase, ele se spală din abundență cu apă. În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

După manipularea medicamentului, spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun.





Utilizare în perioada de gestație și lactație:

A nu se utiliza la femele în timpul perioadei de gestație și alăptare!

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se utiliza concomitent cu alte insecticide.

Supradozare

În caz de supradozare, în calitate de antidot se utilizează sulfat de atropină în doze terapeutice și se asigură un tratament simptomatic.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
06.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiunile ambalajui:

Flacoane din sticlă și/sau polimer cu pulverizatoare a câte 30, 50, 100, 150, 200 ml.

Se eliberează fără o prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

