

PROSPECT

MASTILONG FORTE

suspensie pentru administrare intracisternală

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina, tel./fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

MASTILONG FORTE suspensie pentru administrare intracisternală

Suspensie uleioasă de culoare galbenă cu miros specific.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

O seringă (8g) de medicament conține (mg):

Substanțe active:

Clorhidrat de tetraciclină - 200;

Sulfat de neomicină - 250;

Bacitracină - 2000 UI;

Prednisolon - 10.

Excipienți: Stearat de magneziu; Ulei de vaselină; Propilparaben; Metilparaben; Ulei de floarea soarelui.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul la vaci cu formele clinice și subclinice de mastită cu etiologie bacteriană, cauzată de microorganisme sensibile la componentele medicamentului în timpul perioadei de lactație.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în timpul perioadei de repaus mamar.

Nu se aplică animalelor cu hipersensibilitate la substanțele active ale medicamentului.

6. REACȚII ADVERSE

Nu au fost identificate.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vacii).

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează intracisternal.

Înainte de administrare, tubul seringii este încălzit la o temperatură de 35-38 °C într-o baie de apă și se agită bine.

Vacilor se introduce conținutul unei seringi sau 8 ml (echivalent cu 8 g) de medicament extras din flacon cu ajutorul unui cateter sau cu o seringă sterilă și se administrează lent în lobul afectat al glandei mamare, prealabil fiind, stors de lapte și dezinfectat.

După administrarea medicamentului, se efectuează un masaj ușor al sfertului afectat al glandei mamare (de jos în sus) pentru distribuția sa uniformă în întregul rezervor. Medicamentul se administrează de trei ori cu un interval de 12 ore.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu utilizați MASTILONG FORTE, dacă observați semne vizibile de deteriorare al ambalajului primar. Nu manipulați acest medicament dacă știți că sunteți sensibili la tetraciclină, neomicină, bacitracină, prednisolon sau dacă ați fost sfătuiți să nu lucrați cu astfel de medicamente. Seringa se utilizează o singură dată.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe - 14 zile.

Lapte - utilizarea laptelui în consumul uman nu mai devreme de după 8 mulșori.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, la temperaturi de la + 2 °C până la + 8 °C.

Perioada de valabilitate : 2 ani din data fabricării.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Înainte de administrare, tubul seringii este încălzit la o temperatură de 35-38 °C într-o baie de apă și se agită bine.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Medicamentul poate fi utilizat în perioada de lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt cunoscute.

Supradozare:

Nu se cunoaște.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

06.2023



15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiunile ambalajului:

Seringă de 8 g, ambalate a câte 4 buc., într-o pungă de polimer, flacoane de sticlă de 100 ml, închise cu dop de cauciuc pentru rulare din aluminiu.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

