



REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR ȘI CONCENTRAȚIA MASTILONG FORTE

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

O seringă (8g) de medicament conține (mg):

Substanțe active:

Clorhidrat de tetracilină - 200;

Sulfat de neomicină - 250;

Bacitracină - 2000 UI;

Prednisolon - 10.

Excipienți:

Stearat de magneziu;

Ulei de vaselină;

Propilparaben;

Metilparaben;

Ulei de floarea soarelui.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie pentru administrare intracisternală

Suspensie uleioasă de culoare galbenă cu miros specific.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Bovine (vacii).

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Tratamentul la vaci cu forme clinice și subclinice de mastită cu etiologie bacteriană, cauzată de microorganisme sensibile la componentele medicamentului în timpul perioadei de lactație.

4.3 Contraindicații:

Nu se utilizează în timpul perioadei de repaus mamar.

Nu se aplică animalelor cu hipersensibilitate la substanțele active ale medicamentului.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Înainte de administrare, tubul seringii este încălzit la o temperatură de 35-38 °C într-o baie de apă și se agită bine.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.





4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

Nu au fost identificate.

4.7 Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Medicamentul poate fi utilizat în perioada de lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt cunoscute.

4.9 Doză și calea de administrare:

Se administrează intracisternal.

Înainte de administrare, tubul seringii este încălzit la o temperatură de 35-38 °C într-o baie de apă și se agită bine.

Vacilor se introduce conținutul unei seringi sau 8 ml (echivalent cu 8 g) de medicament extras din flacon cu ajutorul unui cateter sau cu o seringă sterilă și se administrează lent în lobul afectat al glandei mamare, prealabil fiind, stors de lapte și dezinfectat.

După administrarea medicamentului, se efectuează un masaj ușor al sfertului afectat al glandei mamare (de jos în sus) pentru distribuția sa uniformă în întregul rezervor. Medicamentul se administrează de trei ori cu un interval de 12 ore.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

Nu se cunoaște.

4.11 Perioada de așteptare:

Carne și organe - 14 zile,

Lapte – utilizarea laptelui în consumul uman nu mai devreme de după 8 mulșori.

5 PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Grupa farmacoterapeutică: Combinații de antibacteriene și alte substanțe

Codul veterinar ATC: QJ51RV

Particularități farmacodinamice

Mastilong forte este un medicament antimicrobian complex, activ împotriva microorganismelor Gram-pozitive și Gram negative - agenți patogeni ai mastitei.

Clorhidratul de tetraciclină are un efect bacteriostatic asupra *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Klebsiella spp.*

Sulfat de neomicină – este un antibiotic bactericid, aparține grupului de aminoglicozide, acționează asupra microorganismelor Gram-pozitive și Gram-negative (*Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Klebsiella spp.*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus spp.*).

Bacitracina este un antibiotic bactericid care acționează asupra microorganismelor Gram-pozitive și unele bacterii Gram-negative (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus pyogenes*).

Prednisolon este un hormon GCS (glucocorticosteroid), cu acțiune antiinflamatoare, antialergică, cu acțiune desensibilizantă și decongestionantă.



Eficacitate și siguranță clinică

Tratamentul formelor clinice și subclinice de mastită cu etiologie bacteriană, depinde de sensibilitatea microorganismelor implicate în procesul inflamator la substanțele active ale medicamentului.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

După administrarea medicamentului, substanțele active prioritar se elimină cu secretul lactiform, iar o parte se absoarbe în circulația sanguină, fiind metabolizată în ficat și ulterior excretate cu urina și cu fecale.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Stearat de magneziu, ulei de vaselină, propilparaben, metilparaben, ulei de floarea soarelui.

6.2 Incompatibilități:

Nu sunt cunoscute.

6.3 Perioada de valabilitate:

2 ani din data fabricării.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, la temperaturi de la + 2 °C până la +8 °C.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Seringă de 8 g, ambalate a câte 4 buc., într-o pungă de polimer, flacoane de sticlă de 100 ml, închise cu dop de cauciuc pentru rulare din aluminiu.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500, tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87
E-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

230058

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

16.06.2023

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

06.2023

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.