



REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR ȘI CONCENTRAȚIA

E-selen^R.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml de E-selen^R conține:

Substanța activă:

Seleniu (sub formă de selenit de sodiu) - 0,5 mg,

Vitamina E - 50 mg.

Excipienți:

Polietilen-35-ricinol, alcool benzilic, apă pentru injecții.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

Soluție incoloră sau pal gălbuie, puțin opacă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini și pisici, animale de blană, tineret aviar, găini ouătoare.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

E-selen^R se indică pentru profilaxia și tratamentul bolilor provocate de carența vitaminei E și a seleniului (miozite traumatiche și cardiopatii, hepatoză, miodistrofii scheletice) în situații de stres, tulburări de reproducere și creștere, în cazul bolilor infecțioase și parazitare, în timpul vaccinărilor și dehelmintizărilor, în intoxicații cu nitriți, metale grele și micotoxine.

4.3 Contraindicații:

A nu se administra E-selen^R în cazul sensibilității individuale sporite la componentele medicamentului sau în caz de surplus de seleniu în furaje și în organism (alcaloză).

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Păsărilor se administrează în apa de băut, cabalinelor doar intramuscular.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

Se recomandă respectarea termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reia în aceeași doză conform aceeași scheme. Nu se folosește dozaj dublu în locul celui omis.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu E-selen^R, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului se recomandă evitarea contactului direct cu E-selen^R.



Se interzice fumatul și consumul de alimente sau băuturi.

La sfârșitul lucrului, se spală mâinile cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

În urma administrării medicamentului E-selen^R conform instrucțiunii date, reacții adverse și complicații nu apar.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Animalelor gestante și în lactație E-selen^R se administrează cu precauție și sub supravegherea medicului veterinar.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Administrarea concomitentă cu vitamina C, scade biodisponibilitatea medicamentului E-selen^R.

A nu se administra simultan cu medicamente care conțin arseniu (antagonism chimic).

E-selen^R se distruge în urma interacțiunii cu metale grele (mercur, cupru, plumb, staniu) .

4.9 Doza și calea de administrare:

E-selen^R se administrează intramuscular sau subcutanat (cabalinelor doar intramuscular) în scop preventiv 1 dată în 2-4 luni, în scop curativ de 2-3 ori cu interval de 7-10 zile, în doze:

Animale adulte (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine) - 1 ml/50 kg greutate corporală;

Tineretul animalelor agricole (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine) - 0,2 ml/10 kg greutate corporală;

Câini, pisici, animale de blană - 0,04 ml/1 kg greutate corporală.

Pentru facilitarea administrării volumelor mici de medicament, acesta poate fi diluat cu soluție fiziologică sau apă distilată și minuțios omogenizat.

La păsări E-selen^R se administrează în apa de băut diluat în raport de 1:100, în doze de 1 ml/1 kg greutate corporală sau 2 ml/1 l apă de băut: în scop preventiv puilor din prima zi de viață - 1 dată în 2-3 săptămâni, tineretului și păsărilor adulte - 1 dată pe lună; în scop curativ - de 2-3 ori cu interval de 1-2 săptămâni.

Doza curativă poate fi majorată de 1,5 ori, iar în regiunile cu deficit de seleniu - până la 5 ori.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

În caz de supradozare a medicamentului E-selen^R pot apărea fenomene toxice, de aceea doza unui animal nu trebuie să depășească: pentru cabaline - 20 ml, bovine - 15 ml, ovine, caprine, porcine - 5 ml.

În caz de supradozare apare ataxie, dispnee, anorexie, colici abdominale (scrâșnit din dinți), salivă, cianoza tunicilor mucoase, uneori și a pielii, tahicardie, creșterea transpirației, hipotermie. Expirația e cu miros de usturoi, la fel este același miros și la piele

La rumegătoare - hipotonia și atonia prestomacelor. La porcine, câini și pisici - vomă, edem pulmonar.

Antidot specific nu există. Intern se administrează arsenit de sodiu 0,01 g/kg (1 dată) în amestec cu apă, metionină. Intravenos - tiosulfat de sodiu, soluție de glucoză. Pentru normalizarea funcției hepatice se indică acid glutamic, esențiale, vitaminele: B₁ și B₆. Se indică medicamente care conțin butafosfan și carnitin, ca hepatoprotectori și antioxidanți.

Unitiol, dicapto și EDTA nu se indică: complexul chelat a seleniului este mai toxic decât seleniul.

4.11 Perioada de așteptare:

Carne porci, oi, capre - 14 zile; bovine - 30 zile.

Carnea animalelor, sacrificate până la termenul indicat, se utilizează în hrană carnivorelor.

Carne păsări: 0 zile.

Lapte: 0 zile.

Ouă: 0 zile.



5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Grupa farmacoterapeutică: Vitamine și minerale, combinații.

Codul veterinar ATC: QA12CE99

Particularități farmacodinamice

Vitamina E reglează procesele de oxido-reducere și influențează metabolismul lipidelor și glucidelor, potențează acțiunea vitaminelor A și D₃, îmbunătățește imunitatea, mărește rezistența totală a organismului.

Rolul biologic al seleniului este în strânsă legătură cu particularitatea lui de antioxidant.

El grăbește eliminarea substanțelor toxice din organism și sporește imunitatea

Administrarea medicamentului duce la o creștere rapidă a concentrației de vitamina E și a seleniului în organismul animalelor și la normalizarea proceselor metabolice.

Eficacitate și siguranță clinică

E-selen^R compensează insuficiența de vitamina E și seleniu din organismul animalelor.

După gradul de impact asupra organismului, E-selen^R face parte din medicamentele puțin toxice (clasa 4 conform GOST 12.1.007-76). În doze recomandate nu posedă acțiune local-resorbtivă sau sensibilizantă.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Seleniul, în urma administrării pătrunde în organele reproductive și endocrine, în creier, apoi în mușchii scheletici și cord. Vitamina E se distribuie în toate organele și țesuturile, se acumulează în țesutul adipos și SNC.

Se elimină seleniul din organism preponderent cu urina 75% și 25% cu fecalele. Vitamina E este eliminată în formă de metaboliți cu urina.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Polietilen-35-ricinol,

Alcool benzilic,

Apă pentru injecții.

6.2 Incompatibilități:

Administrarea concomitentă cu vitamina C, scade biodisponibilitatea medicamentului E-selen^R.

A nu se administra simultan cu medicamente care conțin arseniu (antagonism chimic).

E-selen^R se distruge în urma interacțiunii cu metale grele (mercur, cupru, plumb, staniu).

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani din data producerii.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 14 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambalaj închis al producătorului, la loc uscat, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T °C de la +4 °C până la +25 °C. A se păstra în locuri inaccesibile copiilor.



6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Flacon din sticlă a câte 20, 50 și 100 ml, ermetic închis cu dop din cauciuc și capac securizat din aluminiu cu clemă de control a primei deschideri.

6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Medicamentul de uz veterinar nefolosit se elimină conform reglementării locale; ambalajele se elimină cu deșeurile menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO "NITA-FARM", 410010, or. Saratov, str. Osipova V.I. 1

Tel./fax: +7(4852)338-600

E-mail: client@nita-farm.ru

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

230060

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

16.06.2023

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

06.2023

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

