

PROSPECT
MOXISTOP mini

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

SRL «NPP «SUZIRYA», str. Poltavskii șleah, 115, or. Harkov, 61093, Ucraina

SRL «NPP «SUZIRYA», str. Zernovaia, 4, or. Harkov, 61105, Ucraina

tel.: +38 (057) 766-36-36

provet.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

MOXISTOP mini, comprimate

Comprimate de culoare albă cu un miros specific.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Un comprimat (120 mg) conține:

Substanța activă:

praziquantel – 20 mg;

moxidectină – 1 mg.

Excipienți: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb, povidonă K-30, croscarmeloză sodică, clorură de sodiu, stearat de calciu, aromă alimentară „cașcaval”.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Se prescrie pentru prevenirea și tratamentul parazitozelor produse de nematode: toxascarioză, toxocaroză, anchilostomiază, uncinarioză, trichuroză, cestode: teniidoză, dipilidioză, mezocestoidoză, și infestațiilor mixte cu nematode și cestode, precum și pentru prevenirea dirofilariozei.

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra câinilor cu vârsta sub 3 săptămâni și pisicilor sub 6 săptămâni!

A nu se administra la animale cu sensibilitate crescută la componentele medicamentului!

Nu se recomandă administrarea medicamentului de uz veterinar la câinii din rasele de Collie, Sheltie, Bobtail, luând în considerație sensibilitatea crescută a acestor rase la lactone macrociclice!

Nu sunt supuse deparazitării animalele epuizate și cele bolnave cu boli infecțioase, precum și animalele cu o greutate corporală sub 0,5 kg!

6. REACȚII ADVERSE

În unele cazuri, la unele animale în caz de infestare puternică pot apărea diareea, vomă, urticarie și mâncărime în zona rectală, anxietate. Aceste semne dispar rapid fără intervenție suplimentară.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici



8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează animalelor pe cale orală, cu hrană sau silit pe rădăcina limbii, în doze:

Greutatea animalului	Doza
MOXISTOP mini	
de la 0,5 până la 1 kg	1/4 comprimate
de la 1,1 până la 2 kg	1/2 comprimate
de la 2,1 până la 4 kg	1 comprimat
de la 4,1 până la 6 kg	1,5 comprimate
de la 6,1 până la 8 kg	2 comprimate

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

În scopuri profilactice, deparazitarea animalelor se efectuează o dată în trimestru, precum și înainte de fiecare vaccinare.

În scopuri terapeutice, deparazitarea se efectuează conform indicațiilor. În caz de intensitate ridicată a invaziei, se recomandă de repetat deparazitarea peste 14 zile.

Pentru prevenirea dirofilariozei în regiunile nefavorabile, medicamentul de uz veterinar se utilizează în perioada primăvară - vară - toamnă: înainte de începerea zborului de țânțari și muște - o singură dată, apoi o dată pe lună și ultima dată nu mai devreme de o lună după finalizarea zborului de insecte.

Nu este necesară o dietă de înfometare și utilizarea laxativelor înainte de deparazitare.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, la loc uscat, separat de alimente și furaje, inaccesibil copiilor și animalelor, la o temperatură de 0 °C – 25 °C.

A nu se utiliza acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe ambalaj.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Respectați principalele reguli de igienă și măsurile de securitate când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se administra la femele în prima jumătate a gestației!

Deparazitarea femelelor cu 3 săptămâni înainte de fătarea preconizată și 2-3 săptămâni după fătare, se efectuează numai pe baza unei evaluări a riscului sub supravegherea unui medic veterinar





Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se administra simultan cu piperazină și alte medicamente care inhibă colinesteraza, precum și cu lactone macrociclice.

Supradozare:

În cazul supradozei cu medicament animalele pot refuza hrana, prezenta o stare depresivă, salivare excesivă, tulburări ale tractului digestiv, mers instabil și tremur. În aceste cazuri, se utilizează enterosorbente și terapie simptomatică.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
07.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Blistere a câte 2 comprimate, ambalate în cutii de carton.

Se eliberează fără o prescripție veterinară.

Numai pentru uz veterinar!

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.



