

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR ȘI CONCENTRAȚIA

MOXISTOP mini

2. COMPOZIȚIE CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Un comprimat (120 g) conține:

Substanțe active:

Praziquantel - 20 mg;

Moxidectină - 1 mg

Excipienți: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb, povidonă K-30, croscarmeloză sodică, clorură de sodiu, stearat de calciu, aromă alimentară „cașcaval”.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate.

Comprimate de culoare albă cu un miros specific.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1. Specii țintă:

Câini, pisici

4.2 Indicații pentru utilizare cu specificarea speciilor țintă:

Se prescrie pentru prevenirea și tratamentul parazitozelor produse de nematode: toxascarioză, toxocaroză, anchilostomiază, uncinarioză, trichuroză, cestode: teniidoză, dipilidioză, mezocestoidoză, și infestațiilor mixte cu nematode și cestode, precum și pentru prevenirea dirofilariozei.

4.3 Contraindicații:

A nu se administra câinilor cu vârsta sub 3 săptămâni și pisicilor sub 6 săptămâni!

A nu se administra la animale cu sensibilitate crescută la componentele medicamentului!

Nu se recomandă administrarea medicamentului de uz veterinar la câinii din rasele de Collie, Sheltie, Bobtail, luând în considerație sensibilitatea crescută a acestor rase la lactone macrociclice!

Nu sunt supuse deparazitării animalele epuizate și cele bolnave cu boli infecțioase, precum și animalele cu o greutate corporală sub 0,5 kg!

4.4. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu sunt.

4.5. Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale:


Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Respectați principalele reguli de igienă și măsurile de securitate când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

În unele cazuri, la unele animale în caz de infestare puternică pot apărea diareea, vomă, urticarie și mâncărime în zona rectală, anxietate. Aceste semne dispar rapid fără intervenție suplimentară.



4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se administra la femele în prima jumătate a gestației!

Deparazitarea femelelor cu 3 săptămâni înainte de fătarea preconizată și 2-3 săptămâni după fătare, se efectuează numai pe baza unei evaluări a riscului sub supravegherea unui medic veterinar

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se administra simultan cu piperazină și alte medicamente care inhibă colinesteraza, precum și cu lactone macrociclice.

4.9 Doză și calea de administrare

Greutatea animalului	Dozaj
MOXISTOP mini	
de la 0,5 până la 1 kg	1/4 comprimate
de la 1,1 până la 2 kg	1/2 comprimate
de la 2,1 până la 4 kg	1 comprimat
de la 4,1 până la 6 kg	1,5 comprimate
de la 6,1 până la 8 kg	2 comprimate

Mod de administrare:

Administrare pe cale orală, cu hrană sau forțat pe rădăcina limbii.

În scopuri profilactice, deparazitarea animalelor se efectuează o dată în trimestru, precum și înainte de fiecare vaccinare.

În scopuri terapeutice, deparazitarea se efectuează conform indicațiilor. În caz de intensitate ridicată a invaziei, se recomandă de repetat deparazitarea peste 14 zile.

Pentru prevenirea dirofilariozei în regiunile nefavorabile, medicamentul de uz veterinar se utilizează în perioada primăvară - vară - toamnă: înainte de începerea zborului de țânțari și muște - o singură dată, apoi o dată pe lună și ultima dată nu mai devreme de o lună după finalizarea zborului de insecte.

Nu este necesară dietă de înfometare și utilizarea laxativelor înainte de deparazitare.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

În cazul supradozei cu medicament animalele pot refuza hrana, prezenta o stare depresivă, salivare excesivă, tulburări ale tractului digestiv, mers instabil și tremur. În aceste cazuri, se utilizează enterosorbente și terapie simptomatică.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1. Proprietăți farmacodinamice:

Grupa farmacologică: medicamente de uz veterinar antihelmintice; praziquantel, combinații.

Codul veterinar ATC: QP52AA51



Particularități farmacodinamice:

MOXISTOP mini aparține grupei de medicamente de uz veterinar antiparazitare combinate. Combinația de moxidectină și praziquantel, care intră în compoziția acestui medicament de uz veterinar, asigură un spectru larg de acțiune antiparazitară, inclusiv asupra stadiilor larvare și adulte ale nematodelor intestinale (*Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxocara mystax*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*), larvelor (*microfilariae*) de nematode din speciile: *Dirofilaria immitis*, *Dirofilaria repens*, cestode: (*Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocestoides lineatus*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.* *Mesocestoides lineatus*), care parazitează la câini și pisici.

Moxidectina este un compus semisintetic din a doua generație de lactone macrociclice din grupul milbemicină. Substanța activă acționează asupra ecto- și endoparaziților. Mecanismul de acțiune se datorează interacțiunii cu acidul gama-aminobutiric și canalelor glutaric-clorice ai paraziților, ceea ce duce la deschiderea canalelor clorice în spațiul postsinaptic și creșterea ionilor de clor, rezultând o scădere ireversibilă a activității musculare, paralizie și moartea paraziților.

Praziquantelul este activ împotriva cestodelor în fazele preimaginale și imaginale a trematodelor. Crește permeabilitatea membranelor celulare pentru ionii de calciu, determinând activitatea musculară, care se modifică prin contracția musculară și paralizia spastică și provoacă distrugerea învelișului exterior al cestodelor mature. Sub influența praziquantelului, teniile sunt aproape complet digerate și nu se depistează în masele fecale.

Eficacitate și siguranță clinică

Medicamentul de uz veterinar după gradul de influență asupra organismului aparține substanțelor cu risc scăzut (clasa de siguranță 4), are proprietăți cumulative slab exprimate, în dozele recomandate nu are efecte embriotoxice și teratogene.

Medicamentul de uz veterinar este toxic pentru albine, pești și alte organisme acvatice!

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Moxidectina

Este eliminat din organism sub formă neschimbată cu fecale.

Praziquantelul

Praziquantelul se absoarbe rapid în canalul digestiv, concentrația plasmatică maximă se atinge peste 1-3 ore, distribuindu-se în organele și țesuturile animalului, se elimină din organism preponderent prin urină (până la 80%) timp de 48 ore.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb, povidonă K-30, croscarmeloză sodică, clorură de sodiu, stearat de calciu, aromă alimentară „cașcaval”.

6.2 Incompatibilități:

A nu se administra simultan cu piperazină și alte medicamente de uz veterinar care inhibă colinesteraza, precum și cu lactone macrociclice.

6.3 Perioada de valabilitate:

3 ani.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambalajul închis al producătorului la loc uscat, separat de alimente și furaje, inaccesibil copiilor și animalelor, la o temperatură de 0 °C – 25 °C.





6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Blistere a câte 2 comprimate, ambalate în cutii de carton.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SRL «NPP «SUZIRYA», str. Poltavskii șleah, 115, or. Harkov, 61093, Ucraina

tel.: +38 (057) 766-36-36

provet.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

230062

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

06.07.2023

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

07.2023

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Se eliberează fără o prescripție veterinară.

