Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT
MOXISTOP midi

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE
SRL «NPP «SUZIRYA», str. Poltavskii şleah, 115, or. Harkov, 61093, Ucraina
SRL «NPP «SUZIRYA», str. Zernovaia, 4, or. Harkov, 61105, Ucraina
tel.: +38 (057) 766-36-36
provet.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

MOXISTOP midi, comprimate.

Comprimate de culoare albă cu un miros specific.

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)
Un comprimat (120 mg) conţine:
Substanţa activă:
praziquantel – 50 mg;
moxidectină – 2,5 mg.

Excipienţi:
lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb, povidonă K-30, croscarmeloză sodică, clorură de sodiu, stearat de calciu, aromă alimentară „pui".

4. INDICAŢII TERAPEUTICE
Se prescrie pentru prevenirea şi tratamentul parazitozelor produse de nematode: toxascarioză, toxocaroză, anchilostomiază, uncinarioză, trichuroză, cestode: teniidoză, dipilidioză, mezocestoidoză, şi infestaţiilor mixte cu nematode şi cestode, precum şi pentru prevenirea dirofilariozei.

5. CONTRAINDICAŢII
A nu se administra câinilor cu vârsta sub 3 săptămâni!
A nu se administra la animale cu sensibilitate crescută la componentele medicamentului!
Nu se recomandă administrarea medicamentului la câinii din rasele de Collie, Sheltie, Bobtail, luând în consideraţie sensibilitatea crescută a acestor rase la lactone macrociclice!
Nu sunt supuse deparazitării animalele epuizate şi cele bolnave cu boli infecţioase, precum şi animalele cu o greutate corporală sub 0,5 kg!

6. REACŢII ADVERSE
În unele cazuri, la unele animale în caz de infestare puternică pot apărea diareea, vomă, urticarie şi mâncărime în zona rectală, anxietate. Aceste semne dispar rapid fără intervenţie suplimentară.

7. SPECII ŢINTĂ
Câini.

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU «VETECO ALLIANCE» S.R.L. IDNO 1014600033071 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează animalelor pe cale orală, cu hrană sau forţat pe rădăcina limbii, în doze:

Greutatea animalului	Dozaj
MOXISTOP midi	
de la 5,1 până la 10 kg	1 comprimat
de la 10,1 până la 15 kg	1,5 comprimate
de la 15,1 până la 20 kg	2 comprimate

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

În scopuri profilactice, deparazitarea animalelor se efectuează o dată în trimestru, precum şi înainte de fiecare vaccinare.
În scopuri terapeutice, deparazitarea se efectuează conform indicaţiilor. În caz de intensitate ridicată a invaziei, se recomandă de repetat deparazitarea peste 14 zile.
Pentru prevenirea dirofilariozei în regiunile nefavorabile, medicamentul de uz veterinar se utilizează în perioada primăvară - vară - toamnă: înainte de începerea zborului de ţânţari şi muşte - o singură dată, apoi o dată pe lună şi ultima dată nu mai devreme de o lună după finalizarea zborului de insecte.
Nu este necesară dietă de înfometare şi utilizarea laxativelor înainte de deparazitare.

10. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, la loc uscat, separat de alimente şi furaje, inaccesibil copiilor şi animalelor, la o temperatură de 0 °C – 25 °C.
A nu se utiliza acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe ambalaj.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă
Nu sunt.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Nu sunt.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale
Respectaţi principalele reguli de igienă şi măsurile de securitate când lucraţi cu astfel de medicamente de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat
A nu se administra la femele în prima jumătate a gestaţiei!
Deparazitarea femelelor cu 3 săptămâni înainte de fătarea preconizată şi 2-3 săptămâni după fătare, se efectuează numai pe baza unei evaluări a riscului sub supravegherea unui medic veterinar.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune
A nu se administra simultan cu piperazină şi alte medicamente de uz veterinar care inhibă colinesteraza, precum şi lactone macrociclice.

Supradozare
În cazul supradozei de medicament animalele pot refuza hrana, prezenta o stare depresivă, salivare excesivă, tulburări ale tractului digestiv, mers instabil şi tremur. În aceste cazuri, se utilizează enterosorbente şi terapia simptomatică.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
07.2023

15. ALTE INFORMAŢII
Blistere a câte 2 comprimate, ambalate în cutii de carton.

Se eliberează fără o prescripţie veterinară.

Numai pentru uz veterinar!

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU
S.R.L. «VETECO ALLIANCE»
IDNO 1014600033271
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ