

Anexa nr. 2



PROSPECT

Ergofor, soluție injectabilă energizantă pentru bovine.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

SA "Farmavet", Republica Moldova, Chișinău, str. Petricani 198.
Tel.: 31-72-67; 99-92-89; 079773340. Fax: 31-72-68;
www.farmavet.md; E-mail: farmavet2017@gmail.com

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ergofor, soluție injectabilă energizantă pentru bovine.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml de medicament conține:

Substanțe active:

Glucoză anhidrică - 250 mg;
Alcool etilic - 125 mg;
Clorură de magneziu - 10 mg;
Clorură de tiamină - 2,5 mg.

Excipienți: Fosfat disodic până la pH 2,5- 4,0; Apă purificată până la 1 ml.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Combaterea stărilor de deshidratare, după hemoragii, enterite prelungite, în insuficiență circulatorie, sindromul vacii culcate, distrofia grasă a ficatului, boli infecțioase, toxiinfecții alimentare, mai ales când animalul refuză aportul de hrană.

5. CONTRAINDICAȚII

În insuficiență renală sau hepatică, hipertensiune arterială, edeme generalizate, edem pulmonar, ascită, boli însoțite de hiperglicemie sau în condiții de hiperexcitabilitate miocardică.

6. REACȚII ADVERSE

Perfuzarea prea rapidă poate avea ca rezultat tahicardie și aritmie cardiacă.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Soluția de Ergofor se administrează intravenos sau intraperitoneal, lent cu picurătoarea sau seringă.

Doza la o administrare constituie 100 mg - 200 mg glucoză /kg masă corporală sau 0,4-0,8 ml soluție/kg masă corporală. Astfel unei bovine cu masa corporală de 450 -500 kg îi revine 200-400 ml soluție. Inițial preparatul va fi încălzit până la temperatura de +37 +38°C. Administrarea repetată poate fi efectuată peste 4-6 ore.



9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

În cazul administrării intravenoase, medicamentul se administrează lent, la temperatura corpului.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

În ambalaje închise ale producătorului, separat de alimente și furaje, la loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperaturi de la +5°C până la +25°C.

A nu se utiliza acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe ambalaj.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului a se utiliza în decurs de 24 ore.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Asigurați perfuzarea intravenoasă lentă la temperatura corpului între timp, supravegheați ritmul cardiac. Întrerupeți perfuzarea în caz de tahicardie și aritmie cardiacă.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În caz de auto-injecție, accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul medicamentului de uz veterinar sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Ergofor poate fi administrat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare:

Efectele nedorite sunt în primul rând cauzate de perfuzările prea rapide. Acestea includ aritmiile cardiace, dispneea și spasmele. În aceste cazuri se întrerupe perfuzarea și dacă este necesar se începe tratamentul simptomatic.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL 08.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Natura și compoziția ambalajului primar:

Flacoane din sticlă de culoare închisă, sigilate cu dopuri de cauciuc sub o capsă de aluminiu, în volum de 100 ml și 200 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

