Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT

Alvet 10% suspensie

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

OOO"NITA-FARM",
410010, or. Saratov, str.Osipova V.I. 1
Tel/fax +7(4852)338-600
e-mail: client@nita-farm.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Alvet 10% suspensie

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

1 ml de suspensie conţine:
Substanţa activă :
Albendazol – 100 mg

Excipienţi:
Polietilenglucol 400 (PEG-400),
Macrogolglycerol hydroxystearate (Kremofor RH 410),
Xantan (gumă xantan),
Alcool benzilic,
Benzoat de sodiu,
Acid citric,
Hidroxid de sodiu,
Apă pentru injecţii.

Suspensie pentru uz intern, omogenă, de culoare de albă la gri deschisă. În timpul depozitării se admite stratificarea suspensiei, care dispare la agitare.

4. INDICAŢII TERAPEUTICE

Alvet®-suspensie se indică în scop curativ şi preventiv bovinelor, cabalinelor şi ovinelor în cazul nematodozelor, trematodozelor şi cestodozelor.

5. CONTRAINDICAŢII

A nu se administra animalelor cu sensibilitate individuală sporită la albendazol.
Se interzice administrarea medicamentului în caz de fascioloză acută, în timpul montei, animalelor cașexice și bolnave de boli infecțioase.

6. REACŢII ADVERSE

La administrarea medicamentului Alvet®-suspensie conform instrucţiunii, reacţii adverse şi complicaţii nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită a animalelor faţă de derivatele grupei carbonatului de benzimidazol şi apariţia reacţiilor alergice, administrarea medicamentului se stopează şi se recurge la administrarea remediilor simptomatice.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

7. SPECII ŢINTĂ
Bovine, cabaline (de sport), ovine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Doze:
Bovinelor - în caz de monieziză, nematodoze pulmonare şi gastro-intestinale în doză de 7,5 ml suspensie /100 kg greutate corporală (7,5 mg/kg albendazol), în caz de fascioloză cronică – în doză de 10,0 ml suspensie /100 kg greutate corporală (10,0 mg/kg albendazol).
Cabalinelor (de sport) - în caz de parascaridoză, strongilatoză (alfortioză, delafondioză), anoplocefaloză şi ciatostomoze se în doză de 7,5 ml suspensie /100 kg greutate corporală (7,5 mg/kg albendazol).
Ovinelor – în caz de monieziză, nematodoze pulmonare şi gastro-intestinale în doză de 0,5 ml suspensie /10 kg greutate corporală (5,0 mg/kg albendazol), în caz de fascioloză cronică – în doză de 0,75 ml suspensie /10 kg greutate corporală (7,5 mg/kg albendazol).

Mod de administrare:
Medicamentul se administrează o singură dată, individual, oral.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ
Dietă specială sau administrarea laxativelor în prealabil nu este necesară.
Înainte de administrare medicamentul bine se agită.
Înainte de administrăre în grup, fiecare serie de medicament se testează pe un grup nu prea mare de animale (10-15 capete), care sunt urmărite timp de 3 zile. În caz de lipsă a complicaţiilor, medicamentul dat se administrează la tot şeptelul.

10. PERIOADA DE AŞTEPTARE
Sacrificarea animalelor pentru consum uman se permite nu mai devreme decât peste 20 zile. Carcasele animalelor obţinute până la termenul limită pot fi folosite în hrana animalelor de blană.
Laptele se interzice a fi folosit în consum uman timp de 7 zile după dehelmintizare. Laptele obţinut până la expirarea termenului limită poate fi folosit în hrana animalelor după prelucrare termică.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A se păstra medicamentul de uz veterinar în ambalaj închis al producătorului, aparte de produse alimentare şi furaje, ferit de raze solare, la loc uscat, la T^{0}C de la 0^{0}C până la +25^{0}C.
A se păstra în locuri inaccesibile copiilor.
Perioada de valabilitate: 3ani din data producerii.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a mbalajului primar: 60 zile.
Se interzice a fi administrat Alvet®-suspensie cu termen expirat.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Dehelmintizarea animalelor cu scop curativ se efctuează după indicaţii, cu scop preventiv – primăvara înainte de păşunat şi toamna înainte de stabulaţie.
Animalelor tinere Alvet®-suspensie se administrează după indicaţie şi sub controlul medicului veterinar conform dozelor recomandate.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Particularităţi deosebite în acţiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.
Se recomandă respectarea dozajului indicat şi a modului de administrare pentru a nu diminua eficienţa terapeutică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reia în aceeaşi doză conform aceeaşi scheme cât mai curând, în continuare perioada între administrări nu se va schimba.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

La manipularea medicamentului de uz veterinar trebuie de respectat regulile comune de igienă personală şi a tehnicii securităţii prevăzute în timpul lucrului cu medicamente de uz veterinar.

Persoaneleor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului se recomandă evitarea contactului direct cu Alvet-®suspensie. În lucru cu acest medicament se interzice fumatul şi consumul alimentelor şi băuturilor. După finisrea lucrului cu Alvet®-suspensie mîinile se spală cu apă caldă şi săpun.

În cazul unui contact accidental al pielaei sau a mucoaselor cu acest medicament de uz veterinar, se spală în abundenţă cu apă. În cazul reacţiilor alergice sau ingestiei accedintale solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul de utilizare sau eticheta.

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Se interzice administrarea medicamentului vacilor şi iepelor gestante în primul trimestru al gestaţiei, oilor gestante în primul semestru al gestaţiei.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:

Administrarea concomitentă a medicamentului Alvet®-suspensie cu medicamentele de uz veterinar care conţin praziquantel sau dexametazonă, duce la mojorarea concentraţiei de albendazol în sîngele animalului.

Supradozare:

Simptomele de bază în caz de supradozare sunt legăte de acţiunea medicamentului asupra organelor de hemopoeză (leucopenie, granulocitopenia, agranulocitoză, trombocitopenia) şi fincţia hepatică (sporirea activităţii transaminazelor hepatice). Animalul poate manifesta anorexie, discoordonare motorică, apatie. În astfel de cazuri se stopează administrarea şi se indică terapie simptomatică.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREAMEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Ambalajele deşarte de la medicament se interzice a fi folosite în uz casnic, ele se elimină cu deşeurile menajere.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

08.2023

15. ALTE INFORMAŢII

Natura şi compoziţia ambalajului primar:

Alvet®-suspensie se produce ambalt în: flacoane de sticlă a câte 100, 250, 500 ml; flacoane din polimer a câte 500 ml, 1 l; canistre din polimer a câte 5 şi 10 l.

La fiecare ambalaj primar se anexează prospect de utilizare.

Se eliberează cu prescripţie veterinară.

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.

SRL" Zoofarmagro", m.Chişinău, str.Cameniţa 4a
Tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru