



PROSPECT

ENTEROGUARD M

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

S.C. ROMVAC COMPANY S.A.
Șos. Centurii nr. 7, 077190 Voluntari,
Jud. Ilfov, România
Telefon : +4021-350-31-06; fax: 350-31-10
e-mail: romvac@romvac.ro

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ENTEROGUARD M, comprimate pentru câini, pisici, păsări de colivie și voliera (canari, papagali), porumbei voiajori și de ornament.

Metronidazol, oxitetraciclina clorhidrat, furazolidonă.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Un comprimat (250 mg) conține:

Substanțe active

Metronidazol	50 mg/comprimat
Oxitetraciclina hidrocloridă	30 mg/comprimat
Furazolidonă	10 mg/comprimat

Excipienți: lactoză, amidon, PVP K30, CMC, aerosil, talc, avicel PH-102, stearat de magneziu.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Enteroguard M comprimate se utilizează pentru prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul enteropatiilor primare și secundare produse de bacterii sensibile la substanțele active și a infecțiilor cu protozoare flagelate, la câini, pisici, păsări de colivie și voliera (canari, papagali), porumbei voiajori și de ornament.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează la tineret cu vârsta mai mică de 4 săptămâni.

Nu se utilizează la porumbeii destinați consumului uman.

6. REACȚII ADVERSE

Nu s-au constatat la dozele recomandate.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, păsări de colivie și voliera (canari, papagali), porumbei voiajori și de ornament.



8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează pe cale orală.

Tratament curativ:

- La câini, pisici medicamentul se utilizează ca atare sau sub formă de suspensie în apa de băut, după o prealabilă marunțire, în doză de 1 comprimat/3 kg greutate corporală/zi, timp de 3 zile consecutive.
- La porumbei voiajori și de ornament, păsări de colivie și voliera, medicamentul se utilizează ca atare sau sub forma de suspensie, după o prealabilă marunțire, în doză de 1/2 comprimat/1,25 kg greutate corporală/zi, respectiv 1/4 comprimat pentru 0,5 - 0,6 kg greutate corporală/zi, timp de 5 zile consecutive.

Preventiv (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat):

Medicamentul se administrează la jumătate din doza recomandată terapeutic.

În toate cazurile este recomandat ca tratamentele cu Enteroguard M comprimate să fie asociate cu administrarea de vitamine.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C, în ambalajul original.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina.

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

A nu se utiliza după data de expirare menționată pe etichetă.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie tinta:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Utilizarea medicamentului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate ale bacteriilor izolate de la animale.

Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informațiile epidemiologice locale referitoare la susceptibilitatea bacteriilor tinta.

Utilizarea medicamentului în afara instrucțiunilor din RCM poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanțele antimicrobiene continute de medicamentul de uz veterinar și poate duce la scăderea eficacității tratamentului cu alte antimicrobiene ca urmare a rezistenței încrucișate.

Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează medicamentul de uz veterinar.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre substanțele care intra în compoziția medicamentului, trebuie să evite contactul cu acesta.



În caz de ingestie accidentală a medicamentului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul medicamentului sau eticheta.
Spălați-vă pe mâini după utilizare.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Utilizarea în perioada de gestație: a nu se utiliza în ultima parte a gestației.

Utilizarea în perioada de lactație: se va face pe baza evaluării balantei risc-beneficiu efectuată de către medicul veterinar responsabil.

Utilizarea în perioada de ouat: nu este cazul.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Medicamentul nu trebuie administrat simultan cu antiacide pe baza de aluminiu sau cu preparate ce contin Ca, Mg sau Fe, datorită apariției reacțiilor de chelatare cu tetraciclinele.

Supradozare:

În cazul intoxicației acute, trebuie inițiată terapia simptomatică și măsurile generale de susținere a animalului.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

09.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiuni de ambalaj:

Flacoane din polietilena de densitate înaltă x 20 comprimate /flacon, x 40 comprimate /flacon

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.



