Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT
SEEVIT
soluție injectabilă

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE
Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service" str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina, tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
SEEVIT, soluție injectabilă

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)
1 ml de medicament conține:
Substanța activă:
Acetat de tocoferol (vitamina E) - 50 mg;
Selenit de sodiu - 0,5 mg.

Excipienți: alcool benzilic, apă pentru preparate injectabile.

4. INDICAȚII TERAPEUTICE *(pe specii țintă)*
Prevenirea și tratamentul bovinelor, cabalinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, câinilor, pisicilor, animalelor de blană, păsărilor de curte cu dereglări ale funcției de reproducere și dezvoltării fetale, boli ale mușchilor albi, miozită traumatică și cardiopatie, distrofie hepatică toxică, întârziere de creștere, infecții și boli invazive, vaccinări preventive și deparazitare, otrăviri cu nitriți, metale grele și micotoxine, situații stresante; pentru a stimula productivitatea, creșterea și dezvoltarea animalelor tinere.

5. CONTRAINDICAȚII
Hipersensibilitate la componentele medicamentului de uz veterinar.
Conținut excesiv de seleniu în organism sau furaj (boală alcalină).

6. REACȚII ADVERSE
Nu sa-u depistat.

7. SPECII ȚINTĂ
Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici, animale de blană, păsări.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE
Bovine, porcine, caprine, ovine - 1 ml de medicament la 50 kg de greutate corporală intramuscular sau subcutanat; bovine cu 60 de zile înainte de stabulație - 15 ml de medicament pe cap de două ori cu un interval de 10-14 zile.
Cabaline - 1 ml de medicament la 50 kg de greutate corporală intramuscular.
Viței, miei, iezi - 0,2-0,3 ml de medicament la 10 kg de greutate corporală intramuscular sau subcutanat; oral cu apă sau hrana în doză de 0,5 ml la 10 kg greutate corporală.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Câini, pisici, animale de blană - 0,04 ml de medicament la 1 kg de greutate corporală intramuscular sau subcutanat; oral cu apă sau alimente în doză de 0,1 ml la 1 kg greutate corporală.

Cu scop preventiv, medicamentul se administrează 1 dată la 2-4 luni, cu scop terapeutic - de 2-3 ori cu un interval de 7-10 zile în aceleaşi doze, dacă este necesar, doza terapeutică poate fi crescută, dar nu mai mult de: pentru bovine - 15 ml, cabaline - 20 ml, ovine, caprine, porcine - 5 ml per cap.

Păsări de curte - în doză de 1-2 ml de medicament la 1 litru de apă, care se utilizează în timpul zilei:
- pui din prima zi de viaţă - 1 dată în 2-3 săptămâni în scop profilactic;
- păsări tinere şi adulte - 1 data pe luna în scop preventiv, cu scop terapeutic - de 2-3 ori cu un interval de 1-2 săptămâni.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de administrare a medicamentului de uz veterinar (în cazul dozelor mici), acesta poate fi diluat cu apă sterilă sau soluţie fiziologică şi bine amestecat.
A se respecta cu strictețe dozele recomandate.

10. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Carne - zero zile;
Lapte şi ouă - zero zile.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi de la +5°C până la +25°C.
A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.
Perioada de valabilitate: 24 luni.

13. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
A nu se supradoza medicamentul de uz veterinar.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul manipulării medicamentului de uz veterinar, este necesar să respectaţi regulile generale de igienă personală şi măsurile de siguranţă prevăzute în lucrul cu medicamentele de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie, lactaţie şi ouat, conform dozelor recomandate.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Nu sunt date.

Supradozare:
Evitaţi supradozajul, deoarece există posibilitatea apariţiei simptomelor de toxicoză.
Doza maximă pentru bovine - 15 ml, cabaline - 20 ml, ovine, caprine, porcine - 5 ml pe cap.
În caz de supradozaj, antidoturile sunt: tiosulfatul de sodiu şi metionina.

Incompatibilităţi:
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI PENTRU DOCUMENTE «FARMAVET» S.A.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar neutilizat sau deşeul provenit din utilizarea acestuia trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

09.2023

15. ALTE INFORMAŢII

Dimensiuni de ambalaj:

Flacoane din sticlă închisă cu dopuri de cauciuc şi capac de aluminiu de 50 sau 100 ml.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

PENTRU DOCUMENTE «FARMAVET» S.A.