

PROSPECT

Litterguard® LT-C, suspensie injectabilă

1 DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul certificatului de înregistrare:

Zoetis Belgium S.A.
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Belgia

Producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

Zoetis Inc.
SUA

2 DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Litterguard® LT-C, suspensie injectabilă

3 DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

O doză de vaccin (2ml) conține:

Substanțe active:

Bacteria Escherichia coli inactivată, tulpină NADC 1471 (K99, F41), titru minim: 1,0 RP (Potență relativă),

Bacteria Escherichia coli inactivată, tulpină NADC 1413 (987P), titru minim: 1,0 RP,

Bacteria Escherichia coli inactivată, tulpină pPS002 (K88), titru minim: 1,0 RP,

Bacteria Escherichia coli inactivată, tulpină NL-1001, titru minim: 1,0 RP,

Bacteria Escherichia coli inactivată, tulpină NL-1005 (K99), titru minim: 1,0 RP,

Clostridium perfringens tip C NL-1003, titru minim de toxoid beta: 10 IAU (Unitatea Internațională de Antitoxine).

Adjuvant:

Al₂O₃ (2%): 12±1% (v/v)

Excipienți:

Merthiolate: 0.01% (w/v)

4 INDICAȚII TERAPEUTICE

Vaccinul Litterguard® LT-C este recomandat pentru vaccinarea scrofițelor și scroafelor gestante sănătoase cu scopul de a transfera purceilor prin colostru de anticorpi maternali împotriva diareilor neonatale cauzate de toxina beta aparținând bacilului *Clostridium perfringens* tipul C și de tulpinile enterotoxigene de *E. Coli*, producătoare de toxine labile la căldură, conținând următorii factori de aderență: K99, K88, 987P și F41.

Durata imunității la purceii nou născuți: 6-8 săptămâni.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu există.



6. REACȚII ADVERSE

Nici o reacție adversă nu a fost observată.

7. SPECII ȚINTĂ

Porcine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Instructiuni generale:

Vaccinul se va agita bine înainte de utilizare. Doza constituie - 2 ml.

Se administrează aseptice intramuscular sau subcutanat.

Vaccinarea primară:

Scroafelor sănătoase, gestante, se va administra 2 doze la interval de 3 săptămâni, în timpul ultimei jumătăți a perioadei de gestație. Ce-a de-a doua doză trebuie să fie inoculată cel puțin cu 2 săptămâni înainte de fătare.

Revaccinare:

Scroafele gestante vor fi revaccinate cu o singură doză cu cel puțin 2 săptămâni înainte de fiecare fătare ulterioară.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu utilizați vaccinul Litterguard® LT-C, dacă observați semne vizibile de deteriorare.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu se vor vaccina animalele cu 21 de zile înainte de sacrificare.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider (2°C- 7°C). Expunerea prelungită la temperaturi mai ridicate poate afecta eficacitatea vaccinului.

A nu se congela.

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere: a se utiliza imediat întregul conținut.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Se vaccinează doar animalele sănătoase.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

La fel ca în cazul multor vaccinuri, accidental, pot să apare reacții de tip anafilactic după prima administrare. Antidotul inițial este epinefrina urmată de administrarea unei terapii de susținere. Răspunsul imun poate să fie viciat în cazul animalelor cu infecții clinice latente sau în perioada de incubație a unor boli infecțioase, a animalelor malnutrite sau parazitare, stresate în urma transporturilor sau datorită condițiilor de mediu defavorabile sau dacă vaccinul nu este administrat în condițiile indicate de producător.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În caz de auto-administrare, auto-injectare, ingestie, contact cu pielea accidentale solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul medicamentului de uz veterinar sau eticheta.



La manipularea medicamentului de uz veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal constând din: salopetă, halat, bonetă, mănuși, respirator, cizme de cauciuc. Vaccinul nu trebuie administrat de femele gestante. Vaccinul nu este patogen pentru om, deoarece este preparat din microorganisme inactivate.

Pentru utilizator:

În cazul unei injectări accidentale cu acest medicament de uz veterinar, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul medicamentului de uz veterinar, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de medicament de uz veterinar. Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat. Inhalare prelungită poate fi dăunătoare.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Poate fi utilizat în perioada de gestație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt disponibile informații privind siguranța și eficacitatea acestui vaccin atunci când este utilizat împreună cu orice alt medicament de uz veterinar. Prin urmare, decizia de a utiliza acest vaccin înainte sau după orice alt medicament de uz veterinar trebuie luată de la caz la caz.

Supradozare:

Nu se cunosc.

Incompatibilități:

A nu se amesteca cu niciun alt medicament de uz veterinar.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente de uz veterinar trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Vaccinul sau flacoanele de sub vaccin nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

10.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Flacoane de sticlă x 10, 50, 250 de doze (doza 2 ml).

Fiecare flacon este însoțit de prospectul vaccinului.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Numai pentru uz veterinar.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.



