Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT

Cetîre s hvostikom[R] comprimate

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

OOO "AVZ S-P", Rusia, 141305, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str.Ţentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Cetîre s hvostikom[R] comprimate

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI (SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

1 comprimat conţine
Substanţă activă:
Megestrol acetat – 5,0 mg.

Excipienţi:
Manitol, lecitină, xilit, lactoză, amidon, plasdon S-630, stearat de calciu, aerosil şi adaos gustativ.

Comprimate pentru uz intern.
Comprimate de culoare de la albă la galben deschis. Se permite colorare neuniformă a suprafeţei comprimatului şi cu incluziuni separate întunecate.

4. INDICAŢII TERAPEUTICE

Se indică cu scop contraceptiv şi pentru reglarea excitării sexuale: căţelelor şi pisicilor – pentru reţinerea şi întreruperea căldurilor, excluderea simptomeleor de gestaţie falsă şi lactaţie, câinilor şi motanilor – pentru diminuarea activităţii sexuale (căldurilor) şi corectarea comportamentului.

5. CONTRAINDICAŢII

Sensibilitatea individuală sporită la componentele medicamentului de uz veterinar (inclusiv în anamneză), maladii a tractului urogenital, tumori, diabet zaharat, disfuncţii hormonale.
Nu se recomandă administrarea medicamentului de uz veterinar animaleleor imature, căţelelor şi pisicilor începând cu ziua a 3-a căldurilor, în timpul gestaţiei şi a lactaţiei.

6. REACŢII ADVERSE

La administrarea Cetîre s hvostikom[R] comprimate conform instrucţiunii, complicaţii şi reacţii adverse nu apar. În rare cazuri poate creşte greutate corporală, poate apărea deprimare sau agresivitate nesemnificativă. La unele animale cu sensibilitate individuală la componentele medicamentului sau în urma administrării de lungă durată poate apărea salivaţie abundentă, vomă, schimbarea apetitului, reacţiilor de comportament şi mărirea glandei mamare. În astfel de cazuri, administrarea medicamentului de uz veterinar se stopează şi la necesitate se administrează remedii simptomatice.

7. SPECII ŢINTĂ

Câini, pisici

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ZOOFARMAGRO PENTRU FACTURI ZOO Farm Agro IDNO 1026000041804 REPUBLICA MOLDOVA

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE; CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

- Pisicilor pentru întreruperea estrului la apariţia primelor semne, dar nu mai tîrziu decât peste 3 zile de la inceputul estrului, câte 1 pastilă (5,0 mg megestrol acetat /animal) pe zi, timp de 8 zile. Pe parcursul unui an nu se recomandă mai mult de două cure. În cazul dificultăţilor determinarii începutului estrului, se recomandă administrarea medicamentului cu scopul reţinerii estrului, decât pentru întreruperea estrului;
- Pisicilor pentru reţinerea estrului se recurge la administrarea în perioada de anestrus (perioada între estrele) câte 1 pastilă, o dată în 2 săptămîni, dar nu mai mult de 18 luni.

Înainte de a începă o cură nouă, se recomandă o perioadă de repaos de 2 luni. Repetarea curei poate fi efectuată atunci cînd funcţia reproductivă îşi revine la normal fiziologic.

- Căţelelor pentru reţinerea estrului medicamentul se indică cu 7-15 zile până la începutul căldurilor, în doză de 1 pastilă/10 kg greutate corporală (0,5 mg megestrol acetat/kg), zilnic.

Durata curei e în dependenţă directă cu termenul de reţinere a estrului, dar nu mai mult de 32 zile.
Estrul la căţea, poate începe după câteva zile de la încetarea administrării medicamentului de uz veterinar. Administrarea de lungă durată (o lună) face ca estrul să se înceapă peste 4-6, uneori peste 2-9 luni.

Dozele zilnice de Cetîre s hvostikom^{R} comprimate pentru prevenirea estrului la căţele în dependenţă de greutate corporală a animalului sunt date în tab.1.

Greutatea corporală animalului, kg	**Doze zilnice de medicament pentru reţinerea estrului la căţele**	
	megestrol acetat, mg	**comprimate**
Până la 5	2,5	0,5
6-10	5	1
11-15	7,5	1,5
16-20	10	2
21-30	15	3
31-40	20	4
41-50	25	5
51-60	30	6

- Căţelelor, pentru întreruperea estrului, medicamentul de uz veterinar se administrează la apariţia primelor semne, dar nu mai târziu decât peste 3 zile de la inceputul estrului, în doză de 2 mg de megestrol acetat /1 kg greutate corporală. Dozele zilnice de medicament pentru întreruperea estrului la căţea, în dependenţă de greutate corporală a animalului sunt prezentate în tab.2. primele 3 zile se administrează doza zilnică, apoi 7 zile-1/2 din doza zilnică. Pe parcursul uniu an, nu se recomandă mai mult de două astfel de cure . În urma îmcetării administrării medicamentului, estrul apare peste 4-6, uneori 2-9 luni.

Greutatea corporală a animalului,kg	**Doze zilnice demedicament pentru întreruperea căldurilor la cătele**	
	megestrol acetat,mg	**comprimate**
Pînă la 5	10	2
6-10	20	4
11-15	30	6
16-20	40	8
21-30	60	12
31-40	80	16
41-50	100	20
51-60	120	24

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ZOOFARMAGRO" PENTRU FACTURI ZOO Farm Agro IDNO 1002600041804 REPUBLICA MOLDOVA

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

- Masculilor pentru diminuarea căldurilor şi corecţia comportamentului, medicamentul de uz veterinar se administrează în următoarele doze:

motanilor -1 comprimat per animal, zilnic, timp de 5-7 zile, apoi 1 dată pe săptămînă până la corectarea comportamentului;

câinilor – 1 comprimat/2,5 kg greutatea corporală (2,0 mg megestrol acetat/kg), zilnic, timp de 7 zile, apoi câte ½ din doza zilnică timp de încă 14 zile.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Cetîre s hvostikom^{R} comprimate se administrează animalelor individual, peroral (intern) pe rădăcina limbii sau cu o cantitate mică de deliciu cu 1-2 ore înainte de hrănire, luînd în consideraţie specia şi sexul animalului.

10. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalaj închis al producătorului, la loc ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare şi furaje, la T^{0}C de la +2^{0}C până la +25^{0}C, în locuri inaccesibile copiilor.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:

Nu este indicat animalelor productive.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Particularităţi deosebite în acţiunea medicamentului de uz veterinar la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.

Se recomandă respectarea dozajului indicat şi a modului de administrare pentru a nu diminua eficienţa terapeutică

În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reia în aceeaşi doză conform aceeaşi scheme.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când manipulaţi medicamentul de uz veterinar, este necesar să respectaţi regulile generale de igienă personală şi măsurile de siguranţă prevăzute atunci când lucraţi cu medicamente de uz veterinar.

La sfârşitul lucrului mâinile se spală cu apă şi săpun.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la componentele medicamentului de uz veterinar trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundenţă cu apă.

În caz de îngerare sau apariţie a reacţiilor alergice e necesar de adresat la o instituţie medicală (cu sine de avut eticheta sau prospect).

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:

Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestaţie şi lactaţie.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:

Nu se recomandă administrarea medicamentului de uz veterinar Cetîre s hvostikom^{R} comprimate, de lungă durată concomitent cu corticosteroizi. Nu există informaţii disponibile referitoare la siguranţă şi eficacitatea medicamentului când este utilizat cu alte medicamente de uz veterinar sau nutreţuri.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ZOOFARMAGRO" PENTRU FACTURI ZOO Farm Agro IDNO 1002600041804 REPUBLICA MOLDOVA

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Supradozare:
În cazul supradozării pot apărea schimbări patologice în ţesuturile uterului şi a ovarelor, hipertrofia glandelor mamare, creşterea nesemnificativă a greutăţii corporale, apetit crescut, apatie.

Incompatibilităţi:
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Medicamentul nefolosit se elimină în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Ambalajele deşarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se elimină cu deşeurile menajere.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
11.2023

15. ALTE INFORMAŢII
Natura şi compoziţia ambalajului primar:
Se prezintă ambalat a câte 10 comprimate, în blistere din peliculă polimerică şi folie de staniol.
Ambalaj secundar: cutie din carton a cîte 1 sau 2 blistere şi prospect.

Se eliberează numai pe bază de prescripţie veterinară.

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.