

PROSPECT

Cloziverm, soluție injectabilă

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

OAȘ „BelVitulunifarm”

211309, sat. Dolzha, str. Sovetskaya d. 26A, raionul Vitebsk, regiunea Vitebsk, Republica Belarus.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Cloziverm, soluție injectabilă

Este un lichid dens cu culoarea de la galben deschis la galben.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1ml de soluție conține, mg:

Substanță activă:

Ivermectin - 10;

Clozantel de sodiu - 125.

Excipienți: 1-metil-2-pirolidonă, alcool benzilic, propilenglicol, apă pentru preparate injectabile.

4. INDICAȚIE TERAPEUTICĂ (pe specii țintă)

Medicamentul de uz veterinar este utilizat pentru a trata bovine și ovine în caz de dictiocauloză, hemonhoză, ostertagioză, tricostrongiloză, cooperioză, nematodiroză, bunostomioză, strongiloidiază, fascioloză, telazioză, hipodermatoză, estroză, sarcoptoidoză.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se permite utilizarea medicamentului de uz veterinar animalelor productive.

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

În cazul apariției a unor complicații în urma administrării a medicamentului de uz veterinar, administrarea acestuia se întrerupe. Dacă observați orice reacție adversă sau credeți că medicamentul de uz veterinar nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Medicamentul de uz veterinar este administrat subcutanat sau intramuscular în regiunea subscapulară, o dată, în doză de 1 ml de medicament la 50 kg greutate corporală a animalului.

În cazul scabiei la animale, medicamentul de uz veterinar se administrează de două ori cu un interval de 7-14 zile.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a se asigura o doză corectă, greutatea corporală trebuie să fie determinată cât mai precis posibil.



Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe - 35 zile.

Animalele sacrificate înainte de termenul indicat se utilizează conform legislației naționale privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman.

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original al producătorului ferit de lumină.

A se păstra la temperatura de la +4°C până la +25°C.

Perioada de valabilitate - 24 luni de la data fabricării, cu condiția respectării cerințelor de transportare și depozitare.

După deschiderea flaconului, medicamentul poate fi folosit timp de 21 de zile, fiind păstrat la temperatura de la +2°C până la +8°C.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

În cazul tratamentelor în grup, fiecare lot de medicament este testat preliminar pe un grup mic (5-10 animale). În absența complicațiilor după 3 zile, medicamentul este utilizat la alte animale.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu medicamentul de uz veterinar se recomandă respectarea regulilor de igienă personală și a tehnicii securității, prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se permite utilizarea medicamentului de uz veterinar în perioada de gestație, cu termen mai mic de 2 săptămâni până la fătare.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Medicamentul de uz veterinar este interzis să fie administrat împreună cu medicamente antiparazitare organoclorurate și organofosforice.

Supradozare:

Nu depășiți doza recomandată.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Medicamentul sau flacoanele goale nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.



APROBAT

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
11.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Natura și compoziția ambalajului primar:

Este ambalat în flacoane sterile de sticlă cu o capacitate de 50, 100 și 200 ml.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

SRL "ZooFarmAgro", MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Camenița, 4a

tel.: (022) 855 073; tel.: (022) 355 240; gsm.: 069 827 427

e-mail: zoofarmagro@mail.ru; www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md



