Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT

Ciprovet 5%, soluţie injectabilă

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/ FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

OOO "AVZ S-P", Rusia, 141305, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Ţentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ciprovet 5%, soluţie injectabilă

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

1 ml de soluţie conţine:
Substanţe active:
Ciprofloxacină – 50 mg/ml

Excipienţi:
Acid succinic, trilon B şi apă pentru injecţii

4. INDICAŢII TERAPEUTICE

Se indică în scop curativ bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, câinilor şi pisicilor în cazul bolilor infecţioase de etiologie bacteriană a tractului gastro-intestinal, căilor respiratorii, tractului urogenital, a articulaţiilor, ţesuturilor moi şi a pielii, în caz de necrobacterioză, bronhopneumonie, colibacterioză, salmoneloză, pasteureloză, micoplazmoză, infecţie ombilicală, rinită atrofică şi sindromul mastit-metrit-agalaxie (MMA) la porci, şi alte infecţii primare şi secundare, agenţii patogeni a căror sunt sensibili la ciprofloxacină.

5. CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi, (inclusiv în anamneză), disfuncţii renale sau hepatice.
Utilizarea medicamentului nu este permisă în cazul tulburării semnificative în dezvoltarea ţesutului cartilajului, afectărilor ale sistemului nervos însoţite de convulsii.
Se interzice utilizarea medicamentuui căţeilor şi pisoilor în primul an de viaţă până la sfârşitul perioadei de creştere.

6. REACŢII ADVERSE

La administrarea medicamentului de uz veterinar Ciprovet 5% conform prospectului dat, reacţii adverse şi complicaţii nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită la componentele medicamentului de uz veterinar şi apariţia reacţiilor adverse (inapetenţă, edem, ataxie, tulburarea coordonării mişcărilor), administrarea se stopează şi se indică terapie desensibilizantă şi simptomatică.

7. SPECII ŢINTĂ

Bovine, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ZOOFARMAGRO" PENTRU FACTURI ZOO farm agro IDNO 1002600041804 REPUBLICA MOLDOVA

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează subcutanat sau intramuscular, în doză de 1 ml/10 kg greutate corporală (5 mg ciprofloxacină /1 kg greutate corporală), 1 dată în zi, timp de 3-5 zile, porcinelor cu sindromul MMA timp de 2 zile, câinilor şi pisicilor - subcutanat, timp de 5-10 zile.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Volumul maximal admis spre injectare într-un punct nu trebuie să depăşească la bovine – 15 ml, porcine – 10 ml, ovine şi viţei – 5 ml, purcei-2,5 ml, câini – 2 ml şi pisici – 1 ml.

10. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Sacrificarea pentru consum uman a bovinelor se permite nu mai devreme decât peste 28 de zile, a porcinelor – nu mai devreme de 14 zile de la ultima administrare a medicamentului de uz veterinar Ciprovet 5% injectabil.
Carcasele animalelor sacrificate înainte de expirarea perioadei de aşteptare, pot fi folosite în hrana animalelor de blană.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.
A se păstra în ambalaj închis al producătorului.
A se păstra la loc uscat, ferit de raze solare directe, aparte de produse alimentare şi furaje.
A nu se păstra la temperatură de la +5 ^{0}C până la +25 ^{0}C.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 21 zile.
Se interzice a fi administrat medicamentului de uz veterinar cu termen expirat.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă
Nu sunt.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Particularităţi deosebite de acţiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.
Se recomandă respectarea dozajului indicat şi a modului de administrare pentru a nu diminua eficienţa terapeutică. În caz de omitere a unei doze, administrarea se reia în aceeaşi doză, conform aceeaşi scheme.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale
În timpul manipulării medicamentului este important de respectat regulile comune de igienă personală şi a tehnicii securităţii prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.
În caz de contact accidental a medicamentului de uz veterinar cu pielea sau tunicile mucoase oculare, e necesar ca cele din urmă să fie spălate din abundenţă cu apă.
Persoanelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului de uz veterinar se recomandă evitarea contactului direct cu Ciprovet 5% injectabil.
În caz de apariţie a reacţiilor alergice sau ingerarea medicamentului de uz veterinar se recomandă adresarea cât de repede posibil la o instituţie medicală (cu sine de avut prospectul sau eticheta).

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie:
Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestaţie şi lactaţie.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ZOOFARMAGRO PENTRU FACTURI
ZOO Farm Agro
IDNO 1002600041804
REPUBLICA MOLDOVA

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Nu se admite administrarea medicamentului Ciprovet 5% injectabil concomitent cu antibioticele bacteriostatice (levomicetină, macrolide şi tetracicline), teofilina şi antiinflamatoarele nesteroidiene.

Supradozare:
În caz de supradozare a medicamentului de uz veterinar poate fi observată inapetenţă, apatie şi vomă.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
Solicitaţi medicului veterinar sau farmacistului informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

12.12.2023

15. ALTE INFORMAŢII

Se produce medicamentul de uz veterinar Ciprovet 5% injectabil ambalat a câte 10, 20, 50, 100 şi 200 ml în flacoane din sticlă întunecată cu volum corespunzător, care se astupă cu dop din cauciuc şi capac din aluminiu. Flacoanele a câte 10, 20, 50 ml sunt plasate în cutii cu instrucţiune.
Fiecare ambalaj este dotat cu instrucţiune.

Se eliberează numai pe bază de prescripţie veterinară.

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.



