Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT

Eimeterm 2,5%, soluţie orală

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul certificatului de înregistrare:
OOO "NVŢ Agrovetzaşcita"
129329, or. Moscova,
Igarschii proezd 4/2
Federaţia Rusă

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:
OOO "AVZ S-P"
141305, reg. Moscova,
or. Serghiev Posad,
str. Ţentralinaia, 1
Federaţia Rusă

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Eimeterm 2,5%, soluţie orală
Soluţie transparentă, de culoare de la galben la maro (se admite opalescenţă).

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

1 ml conţine:
Substanţă activă:
Toltrazuril – 25 mg.

Excipienţi:
Trietanolamin - 400 mg
Polietilenglicol - până la 1 ml

4. INDICAŢIE TERAPEUTICE *(pe specii ţintă)*

Tratamentul şi profilaxia coccidiozei la păsări.

5. CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

6. REACŢII ADVERSE

Reacţii adverse şi complicaţii la păsări în urma administrării a soluţiei Eimeterm 2,5% în conformitate cu prospectul dat nu au fost înregistrate.
În caz de sensibilitate individuală sporită la componentele medicamentului sau apariţia reacţiilor alergice, administrarea se stopează şi se recurge la terapie simptomatică.

Dacă observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ZOOFARMAGRO
PENTRU FACTURI
ZOO Farm Agro
IDNO 1002600041804
REPUBLICA MOLDOVA

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

7. SPECII ŢINTĂ

Pui broiler, tineret de înlocuire, curci, gâşte şi raţe.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Eimeterm soluţie 2,5% se administrează păsărilor în apa de băut 2 zile consecutiv, în doză de 7 mg toltrazuril/ 1 kg greutate corporală (28 ml de medicament de uz veterinar /100 kg greutate corporală), ceea ce este echivalent cu:

- 1 ml/1 l apă de băut, care se dă în consum păsărilor timp de 48 ore consecutiv
- 3 ml/1 l apă de băut, care se dă în consum păsărilor câte 8 ore pe zi, timp de 2 zile.

În cazuri grave de boală, tratamentul se repetă peste 5 zile.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

În perioada administrării soluţiei Eimeterm 2,5%, păsările trebuie să bea numai apă medicamentată.
Soluţia medicamentată îşi păstrează acţiunea sa timp de 48 ore.
În caz dacă apare sediment, soluţia bine se amestecă înainte de administrare.

10 PERIOADA DE AŞTEPTARE

Carne şi organe:
- pui broiler – nu mai devreme decât peste 14 zile
- curci, gîşte şi raţe – nu mai devreme decât peste 16 zile.

Nu se utilizează la păsări de la care se obţin ouă destinate consumului uman

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra în ambalajul original.
A se proteja de lumină solara directă.
A se păstra la temperatură de la 2 °C până la 25 °C.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar - 28 zile.
A nu se utiliza acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Nu se indică animalelor mamifere.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Particularităţi deosebite de acţiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.
În caz de nerespectare a termenului stabilit pentru administrare repetată a medicamentului, în cazuri grave de coccidioză, medicamentul se va administra cât de repede posibil în aceeaşi doză, conform aceeaşi scheme.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
La efectuarea lucrărilor curativ-preventive cu folosirea Eimeterm soluţie 2,5% se recomandă respectarea regulilor comune de igienă personală şi a tehnicii securităţii, prevăzute în lucru cu medicamentele de uz veterinar.
Persoanelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului de uz veterinar se recomandă evitarea contactului direct cu Eimeterm soluţie 2,5%.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ PENTRU FACTURARE ZOO Farm Agro IDNO 1002600041804 REPUBLICA MOLDOVA

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

În caz de contact accidental a medicamentului de uz veterinar cu pielea sau cu tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundenţă cu apă.
În caz de apariţie a reacţiei alergice sau la îngerarea accidentală se recomandă adresarea la o instituţie medicală cît de repede posibil (cu sine de avut instrucţiunea sau eticheta).

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:
Se interzice administrarea Eimeterm 2,5% soluţie găinilor ouătoare şi tineretului de înlocuire nu mai tîrziu decât cu 2 săptămîni înainte de pontă, deoarece se acumulează în ouă.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Eimeterm 2,5% soluţie este compatibil cu vitaminele, adaosurile furajere şi medicamentele de uz veterinar utilizate în avicultură.

Supradozare:
În caz de supradozare la păsări se poate observa inapetenţă, scăderea consumului de apă şi pierderea din greutate.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Ambalajele deşarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deşeurile menajere.
Solicitaţi medicului veterinar sau farmacistului informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAŢII

Medicamentul de uz veterinar se produce ambalat a câte 5, 10, 20, 50 şi 100 ml în flacoane din sticlă sau polimer de volum corespunzător, dotate cu capace-picurători şi/sau capace swist-off cu sigiliu sau dopuri din cauciuc şi căpăcele din aluminiu; a câte 500 ml în flacoane din sticlă sau polimer, a câte 1 l în sticle din polimer; a câte 2,5; 3 şi 5 l în canistre din polimer cu capac şi sigil. Flacoanele a câte 5, 10, 20, 50 şi 100 ml au şi ambalaj secundar-cutii din carton. Se permite producerea flacoanelor a câte 50 şi 100 ml fără ambalaj secundar. Fiecare ambalaj conţine instrucţiune pentru administrare.

Se eliberează numai pe bază de prescripţie veterinară.

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ZOOFARMAGRO
PENTRU FACTURI
ZOO farm Agro
IDNO 1002600041804
REPUBLICA MOLDOVA