

PROSPECT

TREIZURIL, 25 mg/ml, soluție orală pentru pui broiler și curcani.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul certificatului de înregistrare:

Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. – Viale Corassori, 62 – 41124 Modena – Italy

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Industria italiana Integratori TREI S.p.A. - Via Affarosa, 4 – 42010 Rio Saliceto RE – Italy

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

TREIZURIL, 25 mg/ml, soluție orală pentru pui broiler și curcani.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml conține:

Substanța activă:

Toltrazuril - 25 mg

Excipienți:

Trietanolamină, Polietilen glicol

4. INDICAȚIE TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Pui broiler - pentru tratamentul coccidiozei cauzate de *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria maxima*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria tenella*, *Eimeria mitis*.

Curcanii - pentru tratamentul coccidiozei cauzate de *Eimeria adenoeides*, *Eimeria meleagrimitis*.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

A nu se utiliza la puii cu vârsta mai mare de 16 săptămâni.

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

Alternativ, puteți raporta prin intermediul sistemului național de raportare: mvnnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

7. SPECII ȚINTĂ

Pui broiler și curcani.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

A se administra pe cale orală în apa de băut.

Pui broiler și curcani: 7 mg di toltrazuril/kg g./c. egal cu 28 ml de medicament la 100 kg de greutate corporală pe zi, timp de 2 zile consecutive, a se administra continuu timp de 24 ore sau într-o cantitate de apă corespunzătoare la 8 ore de consum.



În funcție de cantitatea aportului de apă, o astfel de doză corespunde la aproximativ 25 mg de toltrazuril pe litru de apă (1 ml de medicament pe litru apă de băut) în cazul administrării continuu timp de 48 de ore sau 75 mg toltrazuril pe litru de apă (3 ml medicament pe litru de apă de băut) în cazul administrării în 8 ore.

Durata tratamentului: 2 zile consecutive.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Diluarea mai mare decât limita recomandată (mai mare decât 1:1000) poate cauza precipitarea medicamentului.

Se amestecă cu grijă în apă de băut.

Apa medicamentată trebuie preparată zilnic.

Medicamentul nu trebuie administrat în apă de băut acidificată.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe: pui broiler 14 zile; curcani 28 de zile.

Nu se utilizează la păsările care produc ouă sau care vor produce ouă pentru consum uman.

Nu se utilizează în interval de 6 săptămâni de la începutul perioadei de ouat.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

Acest medicament de uz veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a containerului: 3 luni.

Perioada de valabilitate după diluare/reconstituire conform indicațiilor: 24 ore.

A nu se utiliza acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru fiecare specie țintă:

Utilizarea repetată sau prelungită ar trebui evitată prin îmbunătățirea practicilor de management prin curățare și dezinfecție.

În cazul terapiei anticoccidiene, eficacitatea medicamentului trebuie evaluată folosind un studiu coprologic după tratament. În cazul în care rezistența la toltrazuril este evidentă din rezultatele unui astfel de test, ar trebui utilizate anticoccidiile aparținând unei clase farmacologice diferite și cu un mecanism de acțiune diferit.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Treizuril este o soluție alcalină.

Contactul direct cu pielea, ochii și inhalarea în timpul manipulării medicamentului trebuie evitat; prin urmare, utilizați un echipament special de protecție constând din haine de protecție, mănuși și mască.

În caz de contact accidental, spălați bine cu apă și săpun.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul manipulării acestui medicament.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

Păsări ouătoare care produc ouă pentru consum uman

A nu se administra la pasarea producătoare de ouă pentru consum uman.

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune:

La curcani, tratamentul în combinație cu antibiotice poate determina o reducere a aportului de apă.

Interacțiunile cu alte medicamente de uz veterinar nu sunt cunoscute.

Medicamentul nu interferează cu dezvoltarea imunității împotriva coccidiozei.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot):

În caz de supradozaj, poate apărea o reducere a aportului de apă.

Incompatibilități:

Medicamentul nu trebuie administrat în apă de băut acidificată.

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

03/2024

15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiuni ambalaj:

Flacon din PVC care conține 1L soluție orală.

Canistre din PE care conțin 5 L și 10 L soluție orală.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

