

PROSPECT

AMOXICRID 60 %

600 mg/g, pulbere hidrosolubilă pentru porcine și pui de gaina (broileri)

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACA SUNT DIFERITI

DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

S.C. CRIDA PHARM S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, Nr. 2, Bloc 101, Ap. 47, Parter, Sector 6, București, Tel/fax: 40 21 430 43 99

E-mail office@cridapharm.ro

PRODUCĂTORUL RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

S.C. CRIDA PHARM S.R.L Oltenița, Str. Stadionului, Nr. 1, Jud. Călărași.

Tel: +40 24 251 5005; Tel/fax: + 40 024 251 5925; E-mail: office@cridapharm.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR:

AMOXICRID 60% , 600 mg/g, pulbere hidrosolubila pentru porcine si pui de gaina (broileri)

Amoxicilina trihidrat

3.DECLARAREA SUBSTANTEI ACTIVE SI A ALTOR INGREDIENTI

Fiecare gram de produs contine:

Substanta activa:

Amoxicilina trihidrat.....600 mg

4.INDICATII:

Porcine : in tratamentul dizenteriei si pasteurelozei porcine.

Pui de gaina (broileri): in tratamentul colibacilozei si tratamentul afectiunilor respiratorii



5.CONTRAINDICATII:

Nu se administreaza in cazuri de hipersensibilitate la amoxicilina, alte substante din grupa beta-lactaminelor sau la oricare dintre excipienti.

6.REACȚII ADVERSE:

Ocazional pot aparea reactii de hipersensibilitate.

Daca observati reactii grave sau alte efecte care nu sunt mentionate in acest prospect, va rugam informati medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ:

Porcine și pui de giana (broileri).

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI) DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE:

Administrare: pe cale orala, in apa de baut.

Tratamentul constă în administrarea produsului Amoxicrid 60%, pe cale orală în apa de baut, individual sau masal, timp de 3-5 zile consecutiv, în doze diferite, în functie de specie, vârstă, greutate corporala, stare fiziologică si stare de sănătate. Pentru tratamentul masal, recomandam calcularea corecta a greutății corporale totale și a cantității de produs care trebuie administrată.

- La porcine : Trebuie asigurată o doza de 15-20 mg s.a. / kg g.c. / zi, respectiv 25-34 mg Amoxicrid 60% / kg g.c. / zi.

CATEGORIA DE GREUTATE	10-20 KG	21-40 KG	41-60 KG	61-80 KG	81-100 KG	scroafe și scrofițe înainte și după montă.	scroafe în lactație.	vieri
<i>Necesar zilnic de apă</i>	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L	15-20 L	7-8 L
<i>Amoxicrid 60% (g /1000 L apa)</i>	350 g	350 g	390 g	445 g	485 g	610 g	280 g	700 g

- La pui de gaina (broileri): Trebuie asigurată o doza de 15-20 mg s.a. / kg g.c. / zi, respectiv 25-34 mg Amoxicrid 60% / kg g.c. / zi.

CATEGORIA DE VARSTA	BROILER 0 – 14 ZILE	BROILER 15 - 28 ZILE	BROILER 29 - 35 ZILE
<i>Amoxicrid 60% (g / 1000 L apa)</i>	90 g	170 g	200 g

Apa de baut medicamentata trebuie sa fie proaspat preparata, la fiecare 12 ore.

Pentru a asigura o doza corespunzatoare se va determina cat mai exact greutatea corporala pentru a evita subdozarea sau supradozarea.

Consumul de apa medicamentata depinde de starea clinica a animalelor. Pentru a obtine o doza corecta, concentratia de amoxicilina trebuie ajustata corespunzator.



9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Consumul de apă trebuie monitorizat, pentru a putea fi garantată doza adecvată. În cazul în care consumul de apă nu corespunde cantităților pentru care au fost calculate concentrațiile recomandate, concentrația de AMOXICRID 60% trebuie adaptată astfel încât animalele să asimileze doza recomandată, în caz contrar trebuie să fie luată în considerare o altă medicație.

10 TIMP DE AȘTEPTARE:

Carne și organe Porcine: 1 zi

Pui de găină (broileri): 7 zile

Nu se utilizează la pasările care produc ouă sau care vor produce ouă pentru consum uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25 °C.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate de la prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

Perioada de valabilitate după reconstituirea în apă de baut: 12 ore

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE):

Precauții speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu există.

Precauții speciale de utilizare:

Precauții speciale de utilizare la animale:

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale.

Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la amoxicilina și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa penicinelor ca urmare a rezistenței încrucișate.

Ingerarea apei medicamentate de către animal poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficientă a apei se va revizui schema de tratament.

Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale atunci când se utilizează produsul

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Produsul poate cauza iritarea tractului respirator și ochii în caz de inhalare sau contact.



Trebuie luate masuri corespunzatoare de protectie in timpul manipularii produsului. Personalul specializat trebuie sa poarte ochelari de protectie si masca. In caz de contact cu ochii, acestia se vor spala cu apa si sapun. A nu se mananca, bea sau fuma in timpul manipularii produsului. Dupa utilizare se spala mainile.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscuta la amoxicilina trebuie sa evite contactul cu acesta.

Utilizare in perioada de gestatie, lactatie sau perioada de ouat:

Produsul poate fi utilizat in perioada de lactatie.

Studiile efectuate pe animalele de laborator nu au evidentiat un potential embriotoxic sau teratogen.

Siguranta produsului nu a fost demonstrata pe parcursul perioadei de gestatie.

Nu se administreaza la pasarile ale caror oua sunt destinate consumului uman.

Interactiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interactiune:

Nu combinati cu alte antibiotice ca tetraciline, deoarece pot produce efect antagonic.

Supradozare:

Nu depasiti doza recomandata.

Incompatibilitati:

In absenta studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Animalele tratate vor fi mentinute in adaposturi pe toata durata tratamentului, iar dejectiile de la acestea se vor colecta si NU se vor folosi la fertilizarea solului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL:
Aprilie 2017

15. ALTE INFORMAȚII:

Produsul este ambalat in pungă x 100 g si 1 kg din folie laminata polietilena tereftalat/ polietilena de joasa densitate.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje sa fie comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

