REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

CAFEINĂ BENZOAT de SODIU 10% soluție injectabilă

Soluţie injectabilă, psihostimulent pentru: cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 ml CAFEINĂ BENZOAT de SODIU 10% soluție injectabilă conţine:

2.1 Substanța activă:

Cafeină benzoat de sodiu – 100 mg

2.2 Excipienți:

Apă purificată până la –1 ml

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1 Specii ţintă:

- Cabaline
- Bovine
- Ovine
- Caprine
- Suine
- Câini
- Pisici

4.2 Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţinta:

Este recomandata in intoxicatii alimentare si medicamentoase, stari de soc, colaps vascular periferic, stari sapremice, septicemii, piemii, dupa fatari laborioase, distocii, pneumonii, bronhopneumonii, peritonite, boli infectioase si parazitare.

4.3 Contraindicaţii:

Produsul nu se va utiliza în stări de agitație, boli cardiace (tahicardie, miocardite) și intoxicații cu strichnină. Nu se utilizează pentru revenirea din narcoză.

4.4 Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:

Nu sunt.

4.5 Precauţii speciale pentru utilizare:

4.5.1 Precauţii speciale de utilizare la animale:

Produsul va fi administrat numai la indicaţiile medicului veterinar. În cazul administrării intravenoase, produsul se injectează cu precauţie.

4.5.2 Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Forma galenică (soluţie injectabilă) previne ca produsul să intre în contact cu utilizatorul său, prin urmare precauţiile normale de manipulare a produsului medicinal sunt suficiente. Bineînţeles, efectul medicamentului trebuie întotdeauna luat în considerare, de aceea se recomandă utilizarea mănuşilor. A se evita autoinjectarea accidentală.

4.6 Reacţii adverse (frecvenţa si gravitate):

Administrat subcutanat uneori poate cauza iritaţii tisulare.

Rareori uşoară stare de agitaţie şi diureză crescută.

4.7 Utilizare in perioada de gestaţie, lactatie sau in perioada de ouat:

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

4.8 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:

Se evită administrarea concomitentă cu chinolone, estrogeni, isoxsuprină, methoxalen, maxiletin, procarbazină.

Se administrează cu prudenţă la animalele tratate cu: fenitionă, nicotine, betablocanţi, teofilină.

4.9 Doză şi cale de administrare:

Produsul se administrează subcutanat în următoarele doze:

Cabaline: 20–80 ml/zi fracţionîndu-se în mai multe reprize (o repriză 5-10 ml);

Bovine: 30–80 ml/zi fracţionîndu-se în mai multe reprize (o repriză 5-10 ml);

Suine: 5–20 ml/zi fracţionîndu-se în mai multe reprize (o repriză 1-3 ml);

Ovine, caprine: 5–20 ml/zi fracţionîndu-se în mai multe reprize (o repriză 1-3 ml);

Câini, pisici: 1–5 ml/zi fracţionîndu-se în mai multe reprize (o repriză 0,5-1 ml).

În colaps, intoxicaţii şi ca diuretic la animale mari, se injectează intravenous, în doză de 25-60 ml, după o prealabilă diluare în 25-60 ml soluţie izotonă clorură de sodiu 0,9%.

4.10 Supradozare:

Se vor respecta dozele recomandate. În caz de supradozare consultaţi medicul veterinar.

4.11 Timp de aşteptare:

Zero zile.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Psihoanaleptice, xantină, derivaţi.

codul ATC: QN06BC01

Proprietăți farmacodinamice:
Cafeina este un alcaloid cu acțiune tonică asupra sistemului nervos central, mărind acuitatea senzorială. Datorită acțiunii excitante centrală asupra centrilor bulbo-medulari, este un analeptic respirator. Crește puterea de contracție a cordului, îmbunătățindu-i ritmul. La nivelul vaselor periferice cutanate renale, coronariene produce vasodilatație ca o compensație la vasoconstricția din interiorul splahnicului. Cafeina are și o acțiune diuretică, prin vasodilatație în zona medulară a rinichiului și prin diminuarea reabsorbției medulare.
Proprietăți farmacocinetice:
Cafeina difuzează bine în țesutiri, chiar și în cele slab irigate, acțiunea ei se manifestă rapid, dar este de scurtă durată iar absorbția este rapidă.
În organism cafeina se demetilează treptat, în cea mai mare parte. Se elimină într-o mică măsură sub această formă, ca atare (trimetilxantina) cea mai mare parte este distrusă, fiind eliminată sub formă de uree.
Excreția se produce predominant prin urină. Principalul component din urină după administrare a fost reprezentat de acidul 1 – metiluric.

6. PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE

6.1. Lista ingredienţilor:
Cafeină benzoat de sodiu
Lista excipienţilor:
Apă purificată
6.2 Incompatibilităţi:
Nu se cunosc.
6.3 Perioada de valabilitate:
Perioada de valabiltate în ambalaj original – 24 luni.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 10 zile.
6.4 Precauţii speciale pentru depozitare:
A nu se lăsa la îndemîna copiiilor.
A se păstra la temperatura 15 - 25°C, ferit de lumină.
A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.
6.5 Natura si compoziţia ambalajului primar:
Flacon din sticlă cu volumul de 100 ml, 200 ml.
6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:
Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

7. DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

„Medicamentum" SRL
MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,
tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39.
e-mail: contact@medicamentum.md
www.medicamentum.md

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

200075

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)
05.08.2020

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

30.01.2020