

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

CAFEINĂ BENZOAT de SODIU 10% soluție injectabilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanța(e) activă(e):

Cafeină benzoat de sodiu – 100 mg

Lista excipienților:

Apă purificată – până la 1 ml

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Este recomandată în intoxicații alimentare și medicamentoase, stări de soc, colaps vascular periferic, stări septicemice, septicemii, piemii, după fatări laborioase, distocii, pneumonii, bronhopneumonii, peritonite, boli infectioase și parazitare.

4. CONTRAINDICAȚII

Produsul nu se va utiliza în stări de agitație, boli cardiace (tahicardie, miocardite) și intoxicații cu strichnină. Nu se utilizează pentru revenirea din narcoză.

5. REACȚII ADVERSE

Administrat subcutanat uneori poate cauza iritații tisulare.



Rareori ușoară stare de agitație și diureză crescută.

6. SPECII ȚINTĂ

-Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se administrează subcutanat în următoarele doze:

Cabaline: 20–80 ml/zi fracționându-se în mai multe reprize (o repriză 5-10 ml);

Bovine: 30–80 ml/zi fracționându-se în mai multe reprize (o repriză 5-10 ml);

Suine: 5–20 ml/zi fracționându-se în mai multe reprize (o repriză 1-3 ml);

Ovine, caprine: 5–20 ml/zi fracționându-se în mai multe reprize (o repriză 1-3 ml);

Câini, pisici: 1–5 ml/zi fracționându-se în mai multe reprize (o repriză 0,5-1 ml).

În colaps, intoxicații și ca diuretic la animale mari, se injectează intravenos, în doză de 25-60 ml, după o prealabilă diluare în 25-60 ml soluție izotonă clorură de sodiu 0,9%.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE (*pentru produsele alimentare țintă*)
chiar dacă aceasta este zero, pentru medicamentul de uz veterinar destinat animalelor de la care se obțin produse alimentare
Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

(*condiții de depozitare și condiții de păstrare ale medicamentului de uz veterinar după reconstituire, diluare, prima deschidere*)

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 15 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (*interdicții*)



Nu sunt.

- Precauții speciale de utilizare la animale:

Produsul va fi administrat numai la indicațiile medicului veterinar. În cazul administrării intravenoase, produsul se injectează cu precauție.

Forma galenică (soluție injectabilă) previne ca produsul să intre în contact cu utilizatorul său, prin urmare precauțiile normale de manipulare a produsului medicinal sunt suficiente. Bineînțeles, efectul medicamentului trebuie întotdeauna luat în considerare, de aceea se recomandă utilizarea mănușilor. A se evita autoinjectarea accidentală.

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

Se evită administrarea concomitentă cu chinolone, estrogeni, isoxsuprină, methoxalen, maxiletin, procarbazină.

Se administrează cu prudență la animalele tratate cu: fenitionă, nicotină, betablocați, teofilină.

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 10 zile.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

se eliberează cu prescripție veterinară.

Flacoane 10 ml produs ambalate în grup în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

30.01.2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

