

**PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR  
DOXI 500 are text comun pentru prospect și etichetă.  
Toate informațiile solicitate sunt raportate direct pe eticheta exterioară a  
produsului.**

**Denumirea comercială,  
concentrația și forma farmaceutică**

**DOXI 500, 500 mg/g  
Pulbere pentru administrare orală**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

*Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:*

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE  
ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA  
SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

*Numele și adresa Chemifarma S.p.A. – Soc. Con Socio Unico*

*Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forlì (Italia)*

*Telefon +39 0543 796464*

*Fax +39 543 796479*

*e-mail info@chemifarma.it*

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA  
FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

*Fiecare gram de pulbere conține:*

**Substanța(e) activă(e):** doxiciclină 500 mg (ca doxiciclina hclat)

**Lista excipienților:** până la 1.00 g.

**3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)**

Pui de carne (broileri) și curcani: tratamentul afecțiunilor cronice respiratorii și a altor afecțiuni respiratorii susținute în special de *Pasteurella spp*, *Mycoplasma spp*, *Haemophilus gallinarum*, *Bordetella avium* și *Chlamydia psittaci*.

Porci: tratamentul rinitelor atrofile și afecțiunilor respiratorii susținute în special de *Actinobacillus spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Mycoplasma spp*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis*.



#### **4. CONTRAINDICAȚII**

Produsul medicinal nu trebuie administrat la animalele care au dovedit hipersensibilitate la tetracicline sau insuficiență hepatică; la animalele cu afecțiuni renale administrarea trebuie să aibă loc sub supraveghere apropiată din partea medicului veterinar. Nu utilizați dacă în fermă s-au înregistrat fenomene de rezistență la tetracicline cauzate de o potențială rezistență încrucișată.

#### **5. REACȚII ADVERSE**

Fotosensibilitate. Reacții alergice. În cazul unui tratament de lungă durată pot apărea modificări ale tractului digestiv datorate disbiozelor intestinale cu tulburări digestive, fecale moi și diaree.

#### **6. SPECII ȚINTĂ**

Porci, pui de carne (broileri) și curcani.

#### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Pui de carne (broileri): 4.0 g produs/100 kg greutate corporală [g.c.] (echivalent cu 20 mg doxiciclină/kg g.c.), ce corespunde cu aproximativ 15-30 g produs/100 litri apă pe zi, timp de 3-5 zile.

Curcani: 4.0 g produs/100 kg g.c. (echivalent cu 20 mg doxiciclină/kg g.c.), ce corespunde cu aproximativ 20-40 g produs/100 litri apă, timp de 3-5 zile.

Porci: 2.0 g produs/100 kg g.c. (echivalent cu 10 mg doxiciclină/kg g.c.) timp de 3-5 zile.

Doza trebuie împărțită în două administrări zilnice.

Pentru a asigura o dozare corectă trebuie determinată cât mai precis greutatea corporală, astfel încât să se evite subdozarea.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Pui de carne (broileri): 6 zile.

Curcani: 8 zile.

Porci: 5 zile.

Nu administrați animalelor care produc ouă pentru consum uman.

#### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

Păstrați produsul protejat de lumină.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Orice produs medicinal sau reziduu derivat din astfel de produs veterinar medicinal, trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

#### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

##### **Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:**

Consumul de medicament de către animale poate fi modificat după boală. Utilizarea repetată sau îndelungată a produsului trebuie evitată, îmbunătățind astfel practicile de management și prin operațiunile de curățare și dezinfectare.



### **Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Folosiți numai după ce ați stabilit sensibilitatea germenilor la principiul activ. Utilizarea produsului care nu respectă instrucțiunile furnizate în Rezumatul Caracteristicilor Produsului poate duce la o creștere a prevalenței bacteriilor rezistente la doxiciclină.

Nu amestecați cu furaje solide. Nu lăsați apa medicamentată la îndemâna animalelor care nu sunt în terapie sau a animalelor sălbatice.

### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

Se recomandă să evitați contactul direct cu pielea, ochii și membranele mucoase în timp ce manipulați produsul, iar operatorul ar trebui să poarte îmbrăcăminte de protecție adecvată. În caz de contaminare, spălați din abundență cu apă și săpun. În caz de înghițire accidentală, cereți imediat asistență medicală, iar dacă este posibil arătați eticheta produsului. Oamenii cu hipersensibilitate la doxiciclină sau tetraciclina sau la oricare din excipienți trebuie să evite orice contact cu medicamentul veterinar. Nu mîncăți, beți sau fumați în timpul manipulării produsului.

### **Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:**

Utilizarea nu este recomandată în timpul gestației, lactației sau perioadei de ouat

### **Interacțiuni**

Nu folosiți împreună cu antibiotice antibacteriene cum ar fi peniciline, aminoglicozide și altele similare. Absorbția doxiciclinei din dietă poate scădea în prezența unor cantități mari de calciu, fier, magneziu și aluminiu. Nu se administrează împreună cu anti-acizi, caolini și preparate pe bază de fier. Doxiciclina sporește acțiunea anticoagulantelor.

Solubilitatea medicamentului veterinar depinde de valoarea pH-ului și scade brusc dacă este amestecat cu soluții alcaline. Nu depozitați apă de băut în recipiente metalice.

### **Supradozare**

Nu sînt disponibile date. Nu depășiți doza recomandată.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

Lună/AN

Perioada de valabilitate după prima deschidere: produsul trebuie consumat imediat și nu se va depozita.

Perioada de valabilitate după diluarea în apă de băut conform instrucțiunilor: 12 ore.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

## **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează numai în baza prescripției veterinare.

## **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

- Ambalaje multi-stratificate de 50 g, 1 Kg și 5 Kg.
- Flacoane de 200 g și 1 kg.



**15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

07/2019

**NUMAI PENTRU UZ VETERINAR**

**A nu se lăsa la îndemîna copiilor.**

AMBALAJ:

LOT NUMĂR:

