

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

FENBENDAZOL 22,2% granulat - uz veterinar

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa: S.A "Farmavet", MD-2059, Republica Moldova, Chișinău, Petricani 198.

Telefon: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89;

Fax: 31-72-68; e-mail: farmavet2017@gmail.com

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanța activă: Fenbendazol – 222 mg

Excipienți: Lactoză, amidon.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

La bovine, ovine, caprine, cabaline, în tratamentul parazitozelor produse de stadii mature și imature ale nematodelor tractusului gastro-intestinal sau respirator. Are efect ovocid la viermii lați. De asemenea are efect asupra cestodelor la bovine.

Cabaline: Strongili mari și mici, ascarizi, oxiuri și specii de strongiloizi.



Bovine: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Strongyloides spp., Oesophagostomum spp., Chabertia spp., Gaigeria pachyscelis, Dictyocaulus filaria și Moniezia spp.

Ovine, caprine: stadii mature și imature de: Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Bunostomum, Trichuris, Strongyloides, Oesophagostomum., Chabertia ovina, Dictyocaulus viviparous - Dictyocaulus Stadiile mature de: Moniezia spp. La miei și Mullerius capillaries la capre.

Suine: tratamentul și controlul nematodelor gastro-intestinale la suinele infectate cu: Ascaris suum (stadii adulte, intestinale și larve migrante), Oesophagostomum spp (stadii adulte), Trichuris suis (stadiile adulte).

Păsări: tratamentul nematodelor gastro-intestinale la păsări infestate cu: Ascaridia galli (L5 și stadii adulte), Heterakis gallinarum (L5 și stadii adulte), Capillaria spp. (L5 și stadii adulte).

Animale de blană: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Taenia spp., Toxocara mystax (stadii mature), Ancylostoma tubaeforme (stadii mature și imature), Taenia spp.

4. CONTRAINDICAȚII: Nu aplicați medicamentul la animale epuizate, cu boli infecțioase.

5. REACȚII ADVERSE: Nu se cunosc.

6. SPECII ȚINTĂ: bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, păsări și animale de blană.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Fenbendazol 22,2 % granulat se administrează oral o dată, pentru deparazitare individuală sau de grup, într-un amestec cu jumătate din norma furajelor, fără o dietă preliminară de foame. În cazul deparazitării în grup, trebuie acordată o atenție deosebită amestecării atente a preparatului cu alimente și consumului acestuia cu toate animalele.



Specia animalului	Greutatea corporală	Doza
Bovine și cabaline	100 kg	3,5 g
	150 kg	5,0 g
	300 – 450 kg	10,0 g
	600 kg	20,0 g
Ovine, caprine	25 kg	0,5 g
	45 – 50 kg	1,0 g
Porcine	25 kg	0,5 g
	100 kg	2,0 g
	150 kg	3,0 g
Păsări	1 kg	0,05 g
Câini, pisici, animale de blană	1 kg	0,02 g
	1 kg	0,02 g
	1 kg	0,02 g

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Animalele pot fi sacrificate pentru carne nu mai devreme de 14 zile după deparazitare. Carnea animalelor sacrificate în mod obligatoriu primite înainte de încheierea perioadei menționate poate fi utilizată pentru a alimenta animalele de blană.

Ouăle de păsări pot fi folosite pentru alimentație nu mai devreme de 4 zile după deparazitare.

Laptele - 3 zile după deparazitare. Ouăle și laptele primite înainte de încheierea perioadei menționate pot fi folosite pentru a hrăni animalele, după procesarea termică.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.

A se păstra la loc uscat.

A se proteja de lumină.

A se feri de îngheț.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Fenbendazol 22,2 % granulat nu trebuie să fie aruncat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Paraziții pot dezvolta rezistență la oricare clasă de antihelmitice în urma repetării frecvente a administrării unui antihelmitic din clasa respectivă.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj

13. STATUT LEGAL

- se eliberează în baza prescripției veterinare

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Punga din aluminiu hidrofobizată a câte 50 g, 100 g și 1000 g în interiorul unei cutii de carton.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Aprilie 2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

