

NOBILIS® SG 9R

Vaccin contra infecțiilor cu *S. gallinarum* și *S. enteritidis* la păsări

Descriere

Nobilis® SG 9R se prezintă sub forma unui flacon ce conține o pastilă liofilizată de culoare alb-gălbui, însoțit de un flacon cu diluant pentru reconstituire.

Compoziție

Fiecare doză conține cel puțin 2×10^7 CFU (unități formatoare de colonii) de *Salmonella gallinarum* tulpina 9R.

Indicații

Imunizarea activă a puilor contra infecțiilor cu *S. gallinarum* (tifoza aviară) și *S. enteritidis*.

Mod de acțiune

Tulpina 9R protejează tineretul de înlocuire față de infecțiile cu *S. gallinarum* (tifoza aviară) și de *S. enteritidis*.

Doze și mod de administrare

Fiecare pasăre se injectează subcutanat (în treimea postero - inferioară dorsală a gâtului) cu 0,2 ml vaccin reconstituit. Pentru reconstituirea vaccinului se folosește Nobilis® FD diluant.

Reconstituirea vaccinului: în flaconul cu pastila liofilizată se adaugă 2 ml diluant; se extrage amestecul existent cu seringă și se introduce într-un flacon cu diluant; flaconul cu vaccin se clătește de 3 ori cu diluant și se adaugă la amestecul vaccinal. Pentru reconstituirea unui flacon de 500 dz. este necesară o cantitate de 100 ml diluant.

Program de vaccinare:

Prima vaccinare: la vârsta de 6 săptămâni.

Revaccinarea: după 12 săptămâni (la transfer).

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave.

Efecte adverse

Nu sunt.

Incompatibilități și interacțiuni

7 zile înainte și 14 zile după vaccinare nu se folosesc antibiotice, chimioterapice sau alte substanțe antibacteriene.

Precauții

Spălați și dezinfectați mâinile înainte și după vaccinare. Se va folosi echipament steril pentru vaccinare.



Perioada de așteptare

Carne: 0 zile

Ouă: 0 zile.

Supradozare

La doze duble nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2 - 8°C, la întuneric și ferit de îngheț.

Valabil – 12luni

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 2 ori

Prezentare

Cutie cu 10 fl. x 1000 doze.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

În caz de apariție a oricăror reacții adverse, contactați deținătorul certificatului de înregistrare și/sau Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

