PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

OXITETRACICLINĂ 5%
unguent

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe săutilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele şi adresa„Medicamentum" SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi
telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39
e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

OXITETRACICLINĂ 5%, unguent

1,0 g OXITETRACICLINĂ 5% unguent conţine:

2.1 Substanţa activă:
Oxitetraciclină clorhidrat – 50 mg
2.2 Excipienţi:
Ulei de vaselină – 50 mg
Vaselină – 900 mg

3. INDICAŢII TERAPEUTICE*(pe specii ţintă)*

Produsul este un antimicrobian cu spectru larg de acţiune, antiseptic, astringent şi stimulator al regenerării tisulare.

4. CONTRAINDICAȚII

Preparatul trebuie să fie administrat cu precauţie la animalele cu ulcere corneene.
Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active sau la excipient.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

-Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se aplică unguentul pe faţa internă a pleoapelor după care se face un masaj uşor pentru a dispersa unguentul, în mod uniform, pe toată suprafaţa globilor oculari. Se aplică de două ori pe zi, timp de 3-7 zile, după caz

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiiilor.
A se păstra în loc uscat, la temperatura 15 - 25°C,ferit de lumină.
A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE *(interdicţii)*

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu sunt.
Precauţii speciale pentru utilizare:
-Precauţii speciale de utilizare la animale:

Evitați contaminarea conținutului produsului în timpul aplicării.
Datorită variabilității probabile (temporale, geografice) în ceea ce privește apariția rezistenței bacteriilor la substanța activă, de câte ori este posibil se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate.

-Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul farmaceutic veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul farmaceutic veterinar.
În cazul ingestiei accidentale se va apela la medic, căruia i se va prezenta prospectul sau eticheta produsului.
La aplicarea produsului se vor utilize mănuși de protecție sterile.

Utilizare in perioada de gestaţie, lactatie sau in perioada de ouat:

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.
Testele de laborator la șoareci și șobolani nu au evidențiat efecte teratogene, fetotoxice sau maternotoxice.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:

Nu se administrează concomitent cu alte preparate de uz local.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabiltate în ambalaj original – 24 luni.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 30 zile.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează fără prescripție veterinară.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUIPRIMAR

Borcănaşe70 g produs ambalateîn cutie de carton, însoţite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

10.03.2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR