

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Stop-intim R picături(Stop-intim R drops).

Denumirea internațională nepatentată: megestrol.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

2.2 Compoziția calitativă și cantitativă

2.2.1 Substanța activă : 1 ml în calitate de substanțe active conține:
megestrol acetat 20 mg

2.2.2 Excipienți: polisorbit-80, polivinilpirolidon, Na-carboximetilceluloză,
glicerol, polietilenglicol-400.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

suspensie perorală.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

Pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Stop-intim^R picături se indică pisicilor pentru prevenirea sau întreruperea căldurilor;
motanilor-pentru diminuarea activității sexuale și corectarea comportamentului.

4.3 Contraindicații:

Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele preparatului (inclusiv în
anamneză), boli a tractului urinar, tumori și diabet. Nu se administrează animalelor
productive.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se agita minuțios flaconul înainte de administrare timp de 1-2 minute.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu preparatul Stop-intim^R picături , e important de respectat regulile
comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu preparate
farmaceutice. Persoanelor cu hipesensibilitate se recomandă evitarea contactului
direct cu preparatul Stop-cistită^R bio. În caz de contact accidental cu pielea sau
tunicile mucoase oculare , ele se spală din abundență cu apă.În caz de ingerare sau
apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de
avut eticheta sau instrucțiunea).

4.6 Reacții adverse:

La administrarea conform instrucțiunii , nu apar. În caz de sensibilitate individuală
sporită a animalelor la componentele preparatului sau în caz de administrare
îndelungată e posibilă salivare abundentă, vomă, modificare a apetitului, reacții de
comportament și hipertrofie mamară. În astfel de cazuri administrarea se stopează și
se recurge la tratament simptomatic.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează animalelor în perioada de gestație sau lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se recomandă administrarea concomitentă a preparatului Stop-intim^R picături cu corticosteroizi. Informații despre interacțiunea cu preparate din alte grupe farmacologice lipsesc.

4.9 Doza și calea de administrare

4.9.1 Doze: Stop-intim^R picături se administrează animalelor peroral, individual cu 1-2 ore pînă la hrănire, picurînd cu picurătorul pe rădăcina limbii sau pe deliciu. Dozajul depinde de sex, greutatea animalului și scopul administrării.

Pisicilor, preparatul Stop-intim^R picături se indică:

- prevenirea căldurilor - în perioada anestrului, 1 dată în săptămîină, 4 picături per animal. Cura de administrare - nu mai mult de 18 luni.

Repetat se va administra după manifestarea ciclului fiziologic normal.

- întreruperea căldurilor - la apariția primelor simptome a căldurilor (dar nu mai tîrziu decît peste 3 zile) 5-7 ori, cu interval de 24 ore, în doză de 9 picături per animal.

Pe parcursul anului se recomandă nu mai mult de două astfel de cure.

Motanelor pentru diminuarea excitației sexuale și corectarea comportamentului, preparatul se indică în doză de 8 picături per animal.

Primele 7 zile preparatul se indică în doză zilnică, apoi încă 14 zile cîte ½ din doză zilnică.

4.9.2 Mod de administrare:

Stop-intim^R picături se administrează animalelor peroral, individual cu 1-2 ore pînă la hrănire, picurînd cu picurătorul pe rădăcina limbii sau pe deliciu.

4.10 Supradozare

Nu au fost înregistrate cazuri.

4.11 Perioada de așteptare:

nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: preparate hormonale din grupa estrogenilor și gestagenilor.

5.1.2 Mecanism de acțiune

Administrarea preparatului Stop-intim^R picături în perioada de anestrul, duce la inhibarea sintezei de estrogeni de către foliculii ovarieni și ca urmare împiedică declanșarea schimbărilor morfologice și psihofiziologice la femele legate de ciclul sexual, în insuficiență de HL, procesul ovulației devine imposibil. La administrarea preparatului, femelelor în 2 sau 3 zi de estru, are loc întreruperea căldurilor.

La masculi, megesterolul acetat scade nivelul testosteronului în sînge și influențează indirect asupra comportamentului și reacțiilor sexuale, diminuînd agresiunea, starea de anxietate și excitație a animalului.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

Megesterol acetat din compoziția preparatului, este un derivat sintetic a hormonului progestagen și posedă capacitatea de a inhiba secreția LH și FSH care sunt secretate de adenohipofiză.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică



Se recomandă respectarea termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

În urma administrării perorale, megestrolul acetat este bine absorbit în intestin, biotransformat în ficat și eliminat în formă de săruri cu urina timp de 48 ore.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților: polisorbat-80, polivinilpirolidon, Na-carboximetilceluloză, glicerol, polietilenglicol-400.

6.2 Incompatibilități:

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate:

2 ani din data producerii.

Termen de valabilitate după prima deschidere: 14-21 zile.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambaj închis al producătorului, la loc uscat, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la $T^{\circ}C$ $2^{\circ}C$ $+25^{\circ}C$. În locuri inaccesibile copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon din polimer cu picurător și capac swift off din plastic a câte 2; 2,5 ml.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar

neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse: preparatul nefolosit se utilizează conform legislației în vigoare, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO "Apicenna", 123242, or. Moscova, str. Drujinnikovskaia,
15, et.5, c I, oficiu 532/5, TEL:89626252752

e karbysheva@apicenna.ru

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

190033

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

20.09.2018

