



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Cistotel Maximum picături

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SA Firma științifico-productivă "Ecoprom", Rusia 140070
regiunea Moscova, Lyubertsy, R. P. Tomilino, str. Garshina nr.11/23, sediu 263
Telefon: +79031045975
E-mail: litvinenko@ekoprom.org
www.ekoprom.org

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Cistotel Maximum picături

1 ml conține:

Substanța activă:

Fipronil - 47,5 mg;

Permetrin - 9,5 mg.

Excipienți:

Dietilen glicol monoetil eter, polietilenglicol 400, ulei esențial de lavandă și alcool izopropilic.

Soluție pentru uz extern.

Soluție transparentă uleioasă, de culoare galben deschis.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Cistotel Maximum picături se administrează câinilor și pisicilor, cățelelor și pisicuțelor de vârstă mai mare de 3 luni în caz de entomoze (purici, păduchi hematofagi din subordinea de insecte aptere, păduchi din subordinea Ischnocera), otodectoză, sarcoptoză, notoedroză, infestare cu căpușe Ixodida, pentru a proteja animalele de atacul insectelor diptere.





4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează animalelor bolnave de maladii infecțioase și convalescente.

Nu se utilizează animalelor cu vârsta mai mici de 3 luni.

5. REACȚII ADVERSE

Efectele secundare și complicațiile la utilizarea Cistotel Maximum picături pentru câini în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

În caz de sensibilitate individuală crescută a animalului la componentele medicamentului, pot apărea reacții individuale (hipersalivație, lacrimare, semne de iritare a pielii). În acest caz animalul bine se spală cu apă și șampon, la necesitate se indică terapia de desensibilizare.

6. SPECII ȚINTĂ

Pisici și câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Cistotel Maximum picături se administrează extern prin picurare pe piele uscată și nedeteriorată (16 picături corespund volumului de 0,5 ml). Se desface blana animalului astfel încât pielea să fie vizibilă și se aplică medicamentul în regiunea gâtului la baza craniului sau între omoplați (în locuri inaccesibile animalelor pentru lins), în doze indicate în table:

Greutatea animalelor	Doza de medicament, ml
Pînă la 2 kg	0,5
De la 2 pînă la 10 kg	1,0
De la 10 pînă la 20 kg	2,0
De la 20 pînă la 30 kg	3,0
De la 30 pînă la 40 kg	4,0
De la 40 pînă la 50 kg	5,0

Pentru tratarea câinilor cu o greutate corporală mai mare de 50 kg Cistotel Maximum picături se administrează în doză de 0,1 ml/kg, aplicând pe piele în 3-4 locuri.

Durata acțiunii de protecție după o singură aplicare: contra căpușelor Ixodida – 30 zile, contra insectelor – pînă la 2 luni.

Tratamentele repetate se efectuează conform indicațiilor, dar nu mai mult decât o dată pe lună.

În caz de otodectoză (râie auriculară) canalul urechii externe se curăță de cruste, apoi se picură în fiecare ureche a câte 1-3 picături de soluție. Tratamentul se repetă peste fiecare 5-7 zile pînă la însănătoșirea animalului.





În caz de sarcoptoză la câini și notoedroză la pisici tratamentul se efectuează de 2 - 4 ori, cu interval de 7 - 10 zile, până la însănătoșirea animalului, ce se adevărește cu două rezultate negative a examenului acarologic de laborator. Cu scopul profilactic – o dată în lună. Se recomandă ca tratamentul să fie complex, folosind medicamente etiotrope, patogenetice și simptomatice.

În caz de atac a căpușelor Ixodida, soluția se aplică pe căpușă și locul de fixare a căpușei pe piele, în cantitate de 1 picătură. În caz dacă căpușa nu cade peste 20 de minute, atunci se îndepărtează atent cu o pensetă și se nimicește.

În scopul de a preveni re-infestarea cu purici, se înlocuiesc așternuturile animalelor sau se prelucurează cu un insecticid în conformitate cu prospectul de utilizare.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original închis, la loc uscat, protejat de acțiunea directă a razelor solare, separat de alimente și furaje, la temperaturi de la 0°C până la 30°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele legislației locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu este destinat utilizării la animale productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

În caz dacă prelucrarea animalului planificată a fost omisă, aceasta trebuie efectuată cât mai curând posibil în aceeași doză.


Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării Cistotel Maximum picături, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Nu fumați și consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Animalele tratate nu trebuie scăldate, manipulate și nu trebuie să fie permis contactul cu copii timp de 48 ore după prelucrare.



În caz de contact accidental cu pielea sau ochii clătiți imediat cu apa în abundență.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Cistotel Maximum picături.

În caz de reacție alergică sau în caz de ingestie accidentală, trebuie imediat de contactat o instituție medicală (să prezentați prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se supun tratamentului femelele gestante sau aflate în lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Cistotel Maximum picături nu trebuie utilizat simultan cu alte insectoacaricide.

Supradozare

Simptome de supradozare nu au fost observate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data producerii.

Termenul de valabilitate după deschiderea ambalajului este de 9 luni.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Tuburi-pipete polimerice x 0,5; 1,0 ml; Flacoane polimerice picurătoare x 0,5 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

08/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

