

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Cistotel Maximum picături

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml conține:

Substanța activă:

Fipronil - 47,5 mg;

Permetrin - 9,5 mg.

Excipienți:

Dietilen glicol monoetil eter, polietilenglicol 400, ulei esențial de lavandă și alcool izopropilic.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție pentru uz extern.

Soluție transparentă uleioasă, de culoare galben deschis.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Pisici și câini.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Cistotel Maximum picături se administrează câinilor și pisicilor, cățeilor și pisicușilor de vârstă mai mare de 3 luni în caz de entomoze (purici, păduchi hematofagi din subordinea de insecte aptere, păduchi din subordinea Ischnocera), otodectoză, sarcoptoză, notoedroză, infestare cu căpușe Ixodida, pentru a proteja animalele de atacul insectelor diptere.

4.3 Contraindicații:

Nu se utilizează animalelor bolnave de maladii infecțioase și convalescente.

Nu se utilizează animalelor cu vârsta mai mici de 3 luni.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:


Nu este destinat utilizării la animale productive.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

În caz dacă prelucrarea animalului planificată a fost omisă, aceasta trebuie efectuată cât mai curând posibil în aceeași doză.



4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării Cistotel Maximum picături, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Nu fumați și consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Animalele tratate nu trebuie scăldate, manipulate și nu trebuie să fie permis contactul cu copii timp de 48 ore după prelucrare.

În caz de contact accidental cu pielea sau ochii clătiți imediat cu apa în abundență.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Cistotel Maximum picături.

În caz de reacție alergică sau în caz de ingestie accidentală, trebuie imediat de contactat o instituție medicală (să prezentați prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

Efectele secundare și complicațiile la utilizarea Cistotel Maximum picături pentru câini în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

În caz de sensibilitate individuală crescută a animalului la componentele medicamentului, pot apărea reacții individuale (hipersalivație, lacrimare, semne de iritare a pielii). În acest caz animalul bine se spală cu apă și șampon, la necesitate se indică terapia de desensibilizare.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se supun tratamentului cu femelele gestante sau aflate în lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Cistotel Maximum picături nu trebuie utilizat simultan cu alte insectoacaricide.


4.9 Doză și calea de administrare

4.9.1 Doze:

Greutatea animalelor	Doza de medicament, ml
Pînă la 2 kg	0,5
De la 2 pînă la 10 kg	1,0
De la 10 pînă la 20 kg	2,0
De la 20 pînă la 30 kg	3,0
De la 30 pînă la 40 kg	4,0
De la 40 pînă la 50 kg	5,0

4.9.2 Mod de administrare:

Cistotel Maximum picături se administrează extern prin picurare pe piele uscată și nedeteriorată (16 picături corespund volumului de 0,5 ml). Se desface blana animalului astfel încât pielea să fie vizibilă și se aplică medicamentul în regiunea gâtului la baza craniului sau între omoplați (în locuri inaccesibile animalelor pentru lins), în doze indicate în tabelul de mai sus.



Pentru tratarea câinilor cu o greutate corporală mai mare de 50 kg Cistotel Maximum picături se administrează în doză de 0,1 ml/kg, aplicând pe piele în 3-4 locuri.

Tratamentele repetate se efectuează conform indicațiilor, dar nu mai des decât o dată pe lună.

În caz de otodectoză (râie auriculară) canalul urechii externe se curăță de cruste, apoi se picură în fiecare ureche a câte 1-3 picături de soluție. Tratamentul se repetă peste fiecare 5-7 zile pînă la însănătoșirea animalului.

În caz de sarcoptoză la câini și notoedroză la pisici tratamentul se efectuează de 2 - 4 ori, cu interval de 7 - 10 zile, pînă la însănătoșirea animalului, ce se adevărește cu două rezultate negative a examenului acarologic de laborator. Cu scopul profilactic – o dată în lună. Se recomandă ca tratamentul să fie complex, folosind medicamente etiotrope, patogenetice și simptomatice.

În caz de atac a căpușelor Ixodida, soluția se aplică pe căpușă și locul de fixare a căpușei pe piele, în cantitate de 1 picătură. În caz dacă căpușa nu cade peste 20 de minute, atunci se îndepărtează atent cu o pensetă și se nimicește.

În scopul de a preveni re-infestarea cu purici, se înlocuiesc așternuturile animalelor sau se prelucrează cu un insecticid în conformitate cu prospectul de utilizare.

4.10 Supradozare

Simptome de supradozare nu au fost observate.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: medicamente insecticide combinate.

Codul ATC: QP53AX65


5.1.2 Mecanism de acțiune:

Fipronil este un insecticid/acaricid care aparține grupului fenilpirazolelor, care acționează prin inhibirea complexului GABA, legîndu-se de canalul de clor și astfel blocând transferul pre-și post-sinaptic al ionilor de clor prin membrană. Aceasta conduce la o activitate necontrolată a sistemului nervos central, provocând astfel paralezia și moartea insectelor.

Mecanismul de acțiune a permetrinei constă în blocarea transmiterii impulsurilor nervoase prin perturbarea funcționării canalelor de sodiu în membranele celulelor nervoase, care provoacă tulburări de coordonare a mișcărilor, paralizie și moartea ectoparaziților.

5.1.3 Efecte farmacodinamice:

Combinția de fipronil și permetrin asigură un spectru larg de acțiune insecticidă și acaricidă asupra insectelor/acarienilor aflate în toate stadiile de dezvoltare, și anume: contra puricilor (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), păduchilor (*Linognathus setosus*, *Trichodectes canis*), căpușelor sarcoptice și Ixodida,



5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Cistotel Maximum picături în funcție de gradul de impact asupra organismului, aparține grupului de substanțe cu pericol moderat (clasa de pericol 3 conform GOST 12.1.007-76), nu posedă efect iritant local și de acțiune resorbtivă a pielii.

Durata acțiunii de protecție după o singură aplicare: contra căpușelor Ixodida – 30 zile, contra insectelor – până la 2 luni.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

După administrare locală a medicamentului fipronil și permetrin sunt distribuite bine în blana animalului la o zi de aplicare; concentrațiile de fipronil și permetrin în blană scad în timp și sunt detectabile timp de cel puțin 35 zile de la aplicare.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Dietilen glicol monoetil eter, polietilenglicol 400, ulei esențial de lavandă și alcool izopropilic.

6.2 Incompatibilități:

Nu utilizați alte medicamente insecticide în același timp.

6.3 Perioada de valabilitate:

Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data producerii.

Termenul de valabilitate după deschiderea ambalajului este de 9 luni.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambalajul original închis, la loc uscat, protejat de acțiunea directă a razelor solare, separat de alimente și furaje, la temperaturi de la 0°C până la 30°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Tuburi-pipete polimerice x 0,5; 1,0 ml; Flacoane polimerice picurătoare x 0,5 ml.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele legislației locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SA Firma științifico-productivă "Ecoprom", Rusia

www.ekoprom.org



APROBAT

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

210079

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data
reînnoirii certificatului de înregistrare)

26.08.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

08/2021

